

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

**DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS SANTE 150 mg, gélule**

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque gélule contient 150 mg de dabigatran étexilate (sous forme de mésilate).

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule.

Gélule d'hypromellose de taille 0 (environ 21 mm), composée d'une coiffe opaque bleu clair et d'un corps opaque de couleur blanche, remplie de granules jaune clair à jaunâtres, portant l'inscription « VTRS » sur « DC150 » sur la coiffe et le corps à l'encre noire.

## 4. DONNEES CLINIQUES

### 4.1. Indications thérapeutiques

Prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et de l'embolie systémique (ES) chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non valvulaire (FANV) et présentant un ou plusieurs facteurs de risque tels que : antécédent d'AVC ou d'accident ischémique transitoire (AIT) ; âge ? 75 ans ; insuffisance cardiaque (classe NYHA ? II) ; diabète ; hypertension artérielle.

Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et prévention des récives de TVP et d'EP chez l'adulte.

Traitement des événements thromboemboliques veineux (ETEV) et prévention des récives d'ETEV chez les patients pédiatriques à partir du moment où l'enfant est capable d'avaler des aliments mous et jusqu'à moins de 18 ans.

Pour connaître les formes pharmaceutiques appropriées en fonction de l'âge, voir rubrique 4.2.

### 4.2. Posologie et mode d'administration

#### Posologie

DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS SANTE, 150 mg gélule peut être utilisé chez les adultes et les enfants âgés d'au moins 8 ans capables d'avaler les gélules entières. La dose indiquée dans le tableau posologique de la formulation concernée doit être prescrite en fonction du poids et de l'âge de l'enfant.

Il existe d'autres formes de doses de dabigatran étexilate adaptées à l'âge pour le traitement des enfants de moins de 8 ans. Lors du passage d'une formulation à une autre, il sera peut-être nécessaire de modifier la dose prescrite.

Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque (prévention des AVC/ES liés à la FA).

Traitement des TVP et des EP, et prévention des récurrences de TVP et d'EP chez l'adulte (TVP/EP).

Les recommandations posologiques de dabigatran éxilate dans les indications de prévention des AVC/ES liés à la FA, de TVP et d'EP sont présentées dans le tableau 1.

**Tableau 1 : Recommandations posologiques pour la prévention des AVC/ES liés à la FA, de TVP et d'EP**

|                                                                                                                                                   | <b>Recommandation posologique</b>                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque</u> | <u>300 mg de dabigatran éxilate, soit une gélule de 150 mg deux fois par jour.</u>                                                                                             |
| <u>Traitement des TVP et des EP, et prévention des récurrences de TVP et d'EP chez l'adulte (TVP/EP)</u>                                          | <u>300 mg de dabigatran éxilate, soit une gélule de 150 mg deux fois par jour après un traitement par un anticoagulant par voie parentérale pendant au moins 5 jours.</u>      |
| <b><u>Réduction posologique recommandée</u></b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| <u>Patients âgés de 80 ans ou plus</u>                                                                                                            | <u>220 mg de dabigatran éxilate par jour, soit 1 gélule de 110 mg deux fois par jour.</u>                                                                                      |
| <u>Patients traités de façon concomitante par du vérapamil</u>                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Réduction posologique à envisager</u></b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| <u>Patients âgés de 75 à 80 ans</u>                                                                                                               | <u>La dose quotidienne de dabigatran éxilate de 300 mg ou 220 mg doit être choisie d'après l'évaluation individuelle du risque thromboembolique et du risque de saignement</u> |
| <u>Patients présentant une insuffisance rénale modérée (ClCr 30-50 mL/min)</u>                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| <u>Patients présentant une gastrite, une ?sophagite ou un reflux gastro-?sophagien</u>                                                            |                                                                                                                                                                                |
| <u>Autres patients présentant un risque augmenté de saignement</u>                                                                                |                                                                                                                                                                                |

Pour la TVP/EP, la recommandation relative à l'utilisation de la dose de 220 mg de dabigatran éxilate, administrée sous forme d'une gélule de 110 mg deux fois par jour, est basée sur des analyses pharmacocinétiques et pharmacodynamiques et n'a pas été étudiée dans ce contexte

clinique. Voir ci-dessous, ainsi que les rubriques 4.4, 4.5, 5.1 et 5.2.

En cas d'intolérance au dabigatran étexilate, les patients doivent être prévenus de la nécessité de consulter immédiatement leur médecin traitant afin de passer à d'autres alternatives thérapeutiques adaptées pour la prévention de l'AVC et de l'embolie systémique associée à une fibrillation atriale ou pour la TVP/EP.

#### Évaluation de la fonction rénale avant et pendant le traitement par dabigatran étexilate

Pour tous les patients et en particulier chez les sujets âgés (plus de 75 ans), étant donné que l'insuffisance rénale peut être fréquente dans ce groupe d'âge :

- Avant l'initiation d'un traitement par dabigatran étexilate, la fonction rénale doit être évaluée en calculant la clairance de la créatinine (ClCr) afin d'exclure les patients présentant une insuffisance rénale sévère ( $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$ ) (voir rubriques 4.3, 4.4 et 5.2).
- La fonction rénale doit être également évaluée lorsqu'une altération de la fonction rénale est suspectée pendant le traitement (par exemple en cas d'hypovolémie, de déshydratation ou d'association avec certains médicaments).

Exigences supplémentaires chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée et chez les patients âgés de plus de 75 ans :

- La fonction rénale doit être évaluée pendant le traitement par dabigatran étexilate au minimum une fois par an et, si nécessaire, plus fréquemment dans les situations cliniques où une diminution ou une altération de la fonction rénale pourrait être suspectée (en cas d'hypovolémie, de déshydratation et d'association avec certains médicaments par exemple).

La méthode à utiliser pour évaluer la fonction rénale (ClCr en mL/min) est celle de Cockcroft-Gault.

#### Durée d'utilisation

La durée d'utilisation du dabigatran étexilate dans les indications de prévention des AVC/ES liés à la FA, de TVP et d'EP sont présentées au tableau 2.

**Tableau 2 : Durée d'utilisation dans la prévention des AVC/ES liés à la FA et la TVP/EP**

| Indication                         | Durée d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prévention des AVC/ES liés à la FA | Le traitement doit être poursuivi sur le long terme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TVP/EP                             | <p>La durée du traitement doit être individualisée après une évaluation approfondie des bénéfices du traitement par rapport au risque de saignement (voir rubrique 4.4).</p> <p>Une courte durée de traitement (au moins 3 mois) doit être basée sur les facteurs de risques transitoires (par exemple, chirurgie récente, traumatisme, immobilisation) et des durées plus longues doivent être basées sur les facteurs de risque permanents ou la présence de formes idiopathiques de TVP ou d'EP.</p> |

### Dose oubliée

Il est toujours possible de prendre une dose de dabigatran éxilate oubliée jusqu'à 6 heures avant la dose programmée suivante. Dans les 6 heures précédant le moment d'administration de la prochaine dose, ne pas rattraper la dose oubliée.

Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée

### Arrêt du dabigatran éxilate

Le traitement par dabigatran éxilate ne doit pas être arrêté sans l'avis d'un médecin. Les patients doivent être informés qu'il leur faut contacter leur médecin traitant si des symptômes gastro- intestinaux, tels qu'une dyspepsie, apparaissent (voir rubrique 4.8).

### Changement de traitement

Passage du dabigatran éxilate à un anticoagulant par voie parentérale :

Il est recommandé d'attendre 12 heures après la dernière dose de dabigatran éxilate pour passer à un anticoagulant par voie parentérale (voir rubrique 4.5).

Passage d'un anticoagulant par voie parentérale au dabigatran éxilate :

Il convient d'arrêter l'anticoagulant par voie parentérale et de commencer à administrer le dabigatran éxilate 0 à 2 heures avant l'heure prévue d'administration de l'autre traitement ou au moment de l'arrêt de ce dernier dans le cas d'un traitement continu (par exemple, héparine non fractionnée [HNF] par voie intraveineuse) (voir rubrique 4.5).

Passage du dabigatran éxilate aux antagonistes de la vitamine K (AVK) :

L'initiation d'un traitement par AVK doit être adaptée en fonction de la ClCr, comme suit :

- ClCr  $\geq$  50 mL/min, les AVK doivent être débutés 3 jours avant l'arrêt du dabigatran éxilate
- ClCr  $\geq$  30- < 50 mL/min, les AVK doivent être débutés 2 jours avant l'arrêt du dabigatran éxilate

Le dabigatran éxilate pouvant influencer l'international normalised ratio (INR), l'INR reflètera davantage l'effet des AVK lorsque le dabigatran éxilate aura été interrompu depuis au moins deux jours. Avant ce délai, les valeurs de l'INR doivent être interprétées avec prudence.

Passage des AVK au dabigatran éxilate :

Les AVK doivent être arrêtés. Le dabigatran éxilate peut être administré dès que l'INR est  $<$  2,0.

### Cardioversion (prévention des AVC/ES liés à la FA)

Les patients peuvent rester sous dabigatran éxilate lorsqu'ils sont soumis à une cardioversion.

### Ablation par cathéter de la fibrillation atriale (prévention des AVC/ES liés à la FA)

L'ablation par cathéter peut être réalisée chez les patients traités par dabigatran éxilate 150 mg deux fois par jour. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le traitement par dabigatran éxilate (voir rubrique 5.1).

### Intervention coronarienne percutanée (ICP) avec pose de stent (prévention des AVC/ES liés à la FA)

Les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire qui bénéficient d'une ICP avec pose de stent peuvent être traités par dabigatran éxétilate en association avec des antiagrégants plaquettaires lorsque l'hémostase est atteinte (voir rubrique 5.1).

## **Populations particulières**

### **Sujets âgés**

Pour les modifications posologiques dans cette population, voir tableau 1 ci-dessus.

### **Patients présentant un risque hémorragique**

Les patients présentant un risque hémorragique accru (voir rubriques 4.4, 4.5, 5.1 et 5.2) doivent faire l'objet d'une surveillance clinique étroite (recherche de signes de saignement ou d'anémie). Le médecin pourra envisager une adaptation de la dose après l'évaluation du bénéfice et du risque potentiels chez un patient donné (voir tableau 1 ci-dessus). Un test de coagulation (voir rubrique 4.4) peut aider à identifier les patients présentant un risque hémorragique accru dû à une exposition excessive au dabigatran. En cas d'exposition excessive au dabigatran chez des patients à risque hémorragique élevé, une dose réduite de 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, est recommandée. Le traitement doit être arrêté en cas de saignement cliniquement pertinent.

Une diminution de la dose peut être envisagée chez les patients présentant une gastrite, une ?sophagite ou un reflux gastro-?sophagien du fait d'un risque élevé de saignement gastro-intestinal majeur (voir tableau 1 ci-dessus et rubrique 4.4).

### **Insuffisance rénale**

Chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min), le traitement par dabigatran éxétilate est contre-indiqué (voir rubrique 4.3).

Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère (ClCr 50-? 80 mL/min). Pour les patients présentant une insuffisance rénale modérée (ClCr 30-50 mL/min), la dose recommandée de dabigatran éxétilate est également de 300 mg, soit une gélule de 150 mg deux fois par jour. Toutefois, pour les patients à risque élevé de saignement, une réduction de la dose de dabigatran éxétilate à 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, devra être envisagée (voir rubriques 4.4 et 5.2). Une surveillance clinique étroite est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale.

Administration concomitante de dabigatran éxétilate et des inhibiteurs faibles à modérés de la P-glycoprotéine (P-gp) tels que l'amiodarone, la quinidine ou le vérapamil

Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire en cas d'administration concomitante avec l'amiodarone ou la quinidine (voir rubriques 4.4, 4.5 et 5.2).

Des réductions de la posologie chez les patients traités en même temps par du vérapamil (voir tableau 1 ci-dessus et rubriques 4.4 et 4.5). Dans ce cas, le dabigatran éxétilate et le vérapamil doivent être pris simultanément.

### **Poids**

Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire (voir rubrique 5.2), mais une surveillance clinique étroite est recommandée chez les patients pesant moins de 50 kg (voir rubrique 4.4).

### **Sexe**

Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire (voir rubrique 5.2).

### **Population pédiatrique**

Il n'existe pas d'utilisation justifiée du dabigatran éxétilate dans la population pédiatrique dans l'indication : prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients présentant une FANV.

## Traitement des ETEV et prévention des récives d'ETEV chez les patients pédiatriques

Chez les patients pédiatriques atteints d'ETEV, le traitement doit être instauré après traitement par un anticoagulant par voie parentérale d'au moins 5 jours. Pour la prévention des récives d'ETEV, le traitement doit également être instauré après le traitement précédent.

Les gélules de dabigatran étexilate doivent être prises deux fois par jour (matin et soir) à peu près à la même heure chaque jour. L'intervalle d'administration doit être aussi proche que possible de 12 heures.

La dose recommandée de dabigatran étexilate en gélules dépend de l'âge et du poids du patient, conformément au tableau 3. Au cours du traitement, cette dose devra être ajustée en fonction du poids et de l'âge du patient.

Aucune recommandation ne peut être donnée quant aux associations de poids et d'âge non reprises dans le tableau posologique.

**Tableau 3 : Dose individuelle et dose quotidienne totale de dabigatran étexilate en milligrammes (mg) en fonction du poids du patient en kilogrammes (kg) et de son âge en années**

| Association poids/âge |               | Dose individuelle<br>en mg | Dose quotidienne<br>totale en mg |
|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| Poids en kg           | Âge en années |                            |                                  |
| 11 à < 13             | 8 à < 9       | 75                         | 150                              |
| 13 à < 16             | 8 à < 11      | 110                        | 220                              |
| 16 à < 21             | 8 à < 14      | 110                        | 220                              |
| 21 à < 26             | 8 à < 16      | 150                        | 300                              |
| 26 à < 31             | 8 à < 18      | 150                        | 300                              |
| 31 à < 41             | 8 à < 18      | 185                        | 370                              |
| 41 à < 51             | 8 à < 18      | 220                        | 440                              |
| 51 à < 61             | 8 à < 18      | 260                        | 520                              |
| 61 à < 71             | 8 à < 18      | 300                        | 600                              |
| 71 à < 81             | 8 à < 18      | 300                        | 600                              |
| > 81                  | 10 à < 18     | 300                        | 600                              |

Doses individuelles nécessitant l'association de plusieurs gélules :

300 mg : 2 gélules de 150 mg ou

4 gélules de 75 mg

260 mg : 1 gélule de 110 mg plus 1 gélule de 150 mg ou

1 gélule de 110 mg plus 2 gélules de 75 mg

220 mg : 2 gélules de 110 mg

185 mg : 1 gélule de 75 mg plus 1 gélule de 110 mg

150 mg : 1 gélule de 150 mg ou

2 gélules de 75 mg

## Évaluation de la fonction rénale avant et pendant le traitement

Avant l'instauration du traitement, le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) doit être calculé au moyen de la formule de Schwartz (méthode utilisée pour le dosage de la créatinine à vérifier auprès du laboratoire local).

Le traitement par dabigatran étexilate est contre-indiqué chez les patients pédiatriques présentant un DFGe < 50 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> (voir rubrique 4.3).

La dose prescrite aux patients présentant un DFGe  $\geq 50$  mL/min/1,73 m<sup>2</sup> doit être déterminée selon le tableau 3.

Pendant le traitement, la fonction rénale doit être évaluée dans les situations cliniques où une diminution ou une altération de la fonction rénale pourrait être suspectée (par exemple, hypovolémie, déshydratation, association avec certains médicaments, etc.).

### Durée d'utilisation

La durée du traitement doit être individualisée après une évaluation du profil bénéfice/risque.

### Dose oubliée

Il est toujours possible de prendre une dose de dabigatran éxilate oubliée jusqu'à 6 heures avant la dose programmée suivante. Dans les 6 heures précédant le moment d'administration de la prochaine dose, ne pas rattraper la dose oubliée.

Ne jamais prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

### Arrêt du dabigatran éxilate

Le traitement par dabigatran éxilate ne doit pas être arrêté sans l'avis d'un médecin. Les patients ou leurs aidants doivent être informés qu'il leur faut contacter le médecin traitant si des symptômes gastro-intestinaux, tels qu'une dyspepsie, apparaissent (voir rubrique 4.8).

### Changement de traitement

Passage du dabigatran éxilate à un anticoagulant par voie parentérale :

Il est recommandé d'attendre 12 heures après la dernière dose de dabigatran éxilate pour passer à un anticoagulant par voie parentérale (voir rubrique 4.5).

Passage d'un anticoagulant par voie parentérale au dabigatran éxilate :

Il convient d'arrêter l'anticoagulant par voie parentérale et de commencer à administrer le dabigatran éxilate 0 à 2 heures avant l'heure prévue d'administration de l'autre traitement, ou au moment de l'arrêt de ce dernier dans le cas d'un traitement continu (par exemple, héparine non fractionnée [HNF] par voie intraveineuse) (voir rubrique 4.5).

Passage du dabigatran éxilate aux antagonistes de la vitamine K (AVK) :

Les patients doivent commencer à prendre les AVK 3 jours avant l'arrêt du dabigatran éxilate.

Le dabigatran éxilate pouvant influencer l'international normalised ratio (INR), l'INR reflètera davantage l'effet des AVK lorsque le dabigatran éxilate aura été interrompu depuis au moins deux jours. Avant ce délai, les valeurs de l'INR doivent être interprétées avec prudence.

Passage des AVK au dabigatran éxilate :

Les AVK doivent être arrêtés. Le dabigatran éxilate peut être administré dès que l'INR est  $< 2,0$ .

### Mode d'administration

Ce médicament doit être administré par voie orale.

Les gélules peuvent être prises avec ou sans aliments. Elles doivent être avalées entières avec un verre d'eau pour faciliter la distribution dans l'estomac. Les patients doivent avoir pour instruction de ne pas ouvrir les gélules, car cela pourrait augmenter le risque de saignement (voir rubriques 5.2 et 6.6).

### 4.3. Contre-indications

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1
- Insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min) chez l'adulte
- DFGe < 50 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> chez les patients pédiatriques
- Saignement évolutif cliniquement significatif
- Lésion ou maladie jugée à risque significatif de saignement majeur. Ceci s'applique à une ulcération gastro-intestinale en cours ou récente, à la présence de néoplasies malignes à haut risque de saignement, à une lésion cérébrale ou rachidienne récente, à une intervention chirurgicale cérébrale, rachidienne ou ophtalmologique récente, à une hémorragie intracrânienne récente, aux varices œsophagiennes connues ou suspectées, aux malformations artérioveineuses, à un anévrisme vasculaire ou à une anomalie vasculaire majeure intrarachidienne ou intracérébrale
- Traitement concomitant avec tout autre anticoagulant, par exemple héparine non fractionnée (HNF), héparines de bas poids moléculaire (énoxaparine, dalteparine, etc.), dérivés de l'héparine (fondaparinux, etc.), anticoagulants oraux (warfarine, rivaroxaban, apixaban, etc.), sauf dans les circonstances particulières suivantes : changement de traitement anticoagulant (voir rubrique 4.2), administration d'une HNF aux doses nécessaires au maintien de la perméabilité d'un cathéter central veineux ou artériel ou administration d'une HNF pendant l'ablation par cathéter de la fibrillation atriale (voir rubrique 4.5)
- Insuffisance hépatique ou maladie du foie susceptible d'avoir un impact sur la survie
- Traitement concomitant avec des inhibiteurs puissants de la P-gp : le kétoconazole administré par voie systémique, la ciclosporine, l'itraconazole, la dronédarone et l'association à dose fixe de glécaprévir/pibrentasvir (voir rubrique 4.5)
- Porteurs de prothèses valvulaires cardiaques nécessitant un traitement anticoagulant (voir rubrique 5.1)

### 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

#### Risque hémorragique

Le dabigatran étextilate doit être utilisé avec prudence chez les sujets présentant un risque hémorragique accru ou en cas d'administration concomitante avec des médicaments altérant l'hémostase par inhibition de l'agrégation plaquettaire. Au cours du traitement, un saignement peut se produire à n'importe quel endroit. Une chute inexplicée du taux d'hémoglobine et/ou de l'hématocrite ou une baisse de la pression artérielle doivent faire rechercher une source de saignement.

Chez l'adulte, dans les situations de saignements menaçant le pronostic vital ou incontrôlés, lorsqu'une réversion rapide de l'effet anticoagulant du dabigatran est requise, l'agent de réversion spécifique, à savoir l'idarucizumab, est disponible. L'efficacité et la sécurité de l'idarucizumab n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques. L'hémodialyse permet d'éliminer le dabigatran. Chez les patients adultes, les autres options possibles sont l'administration de sang total frais ou de plasma frais congelé, de concentré de facteurs de



coagulation (activés ou non activés), de facteur VIIa recombinant ou de concentrés plaquettaires (voir également rubrique 4.9).

Dans des études cliniques, le dabigatran éxilate a été associé à des taux plus élevés de saignement gastro-intestinal (GI) majeur. Un risque accru a été observé chez les personnes âgées ( $\geq 75$  ans) pour la posologie de 150 mg deux fois par jour. D'autres facteurs de risque (voir également tableau 4) comprennent l'administration concomitante d'antiagrégants plaquettaires tels que le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ainsi que la présence d'une œsophagite, d'une gastrite ou d'un reflux gastro-œsophagien.

#### Facteurs de risque

Le tableau 4 récapitule les facteurs pouvant majorer le risque hémorragique.

Tableau 4 : Facteurs pouvant majorer le risque hémorragique

|                                                         | Facteur de risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteurs pharmacodynamiques et pharmacocinétiques       | Âge $\geq 75$ ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Facteurs augmentant les taux plasmatiques de dabigatran | <p>Majeur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Insuffisance rénale modérée chez les patients adultes (ClCr 30-50 mL/min)</li><li>• Inhibiteurs puissants de la P-gp (voir rubriques 4.3 et 4.5)</li><li>• Traitement concomitant avec un inhibiteur faible à modéré de la P-gp (par exemple, amiodarone, vérapamil, quinidine et ticagrélor ; voir rubrique 4.5)</li></ul> <p>Mineur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faible poids (<math>&lt; 50</math> kg) chez les patients adultes</li></ul> |
| Interactions pharmacodynamiques (voir rubrique 4.5)     | <ul style="list-style-type: none"><li>• AAS et autres antiagrégants plaquettaires tels que le clopidogrel</li><li>• AINS</li><li>• ISRS ou IRSNA</li><li>• Autres médicaments susceptibles d'altérer l'hémostase</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                | Facteur de risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pathologies / interventions associées à des risques hémorragiques particuliers | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles congénitaux ou acquis de la coagulation</li> <li>• Thrombopénie ou anomalies fonctionnelles des plaquettes</li> <li>• Biopsie récente, traumatisme majeur</li> <li>• Endocardite bactérienne</li> <li>• ?sophagite, gastrite ou reflux gastro-<br/>?sophagien</li> </ul> |

Peu de données sont disponibles chez les patients adultes pesant moins de 50 kg (voir rubrique 5.2).

L'administration concomitante de dabigatran éxétilate et d'inhibiteurs de la P-gp n'a pas été étudiée chez les patients pédiatriques, mais pourrait augmenter le risque de saignement (voir rubrique 4.5).

Précautions et prise en charge du risque hémorragique

Pour la prise en charge des complications hémorragiques, voir également rubrique 4.9.

Évaluation du profil bénéfice/risque

L'existence concomitante de lésions, maladies, interventions et/ou traitements pharmacologiques (tels que les AINS, les antiagrégants plaquettaires, les ISRS et les IRSNA, voir rubrique 4.5), qui augmentent de façon significative le risque de saignement majeur nécessite une évaluation attentive du bénéfice et du risque. Le dabigatran éxétilate doit être prescrit uniquement si le bénéfice est supérieur au risque de saignement.

Les données cliniques concernant les patients pédiatriques présentant des facteurs de risque, notamment les patients présentant une méningite active, une encéphalite ou un abcès intracrânien (voir rubrique 5.1), sont limitées. Chez ces patients, le dabigatran éxétilate doit être prescrit uniquement si le bénéfice attendu est supérieur au risque de saignement.

Surveillance clinique étroite

Une surveillance étroite à la recherche de signes d'hémorragies ou d'anémie est recommandée pendant toute la durée du traitement, en particulier si des facteurs de risque sont associés (voir tableau 4 ci-dessus). Une attention particulière est requise lorsque le dabigatran éxétilate est administré conjointement à du vérapamil, de l'amiodarone, de la quinidine ou de la clarithromycine (inhibiteurs de la P-gp) et en particulier en cas de saignement, notamment chez les patients qui présentent une fonction rénale diminuée (voir rubrique 4.5).

Une surveillance étroite à la recherche de signes d'hémorragies est recommandée chez les patients traités concomitamment avec des AINS (voir rubrique 4.5).

Arrêt du dabigatran éxétilate

Le traitement par dabigatran éxétilate doit être arrêté chez les patients développant une insuffisance rénale aiguë (voir également rubrique 4.3).

En cas de survenue d'une hémorragie sévère, le traitement doit être arrêté, l'origine des saignements recherchée et l'utilisation de l'agent de réversion spécifique (idarucizumab) peut être envisagée chez les patients adultes. L'efficacité et la sécurité de l'idarucizumab n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques. L'hémodialyse permet d'éliminer le dabigatran.

## Utilisation d'un inhibiteur de la pompe à protons

L'administration d'un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) peut être envisagée pour prévenir une hémorragie GI. Chez les patients pédiatriques, les recommandations des Résumés des Caractéristiques du Produit des inhibiteurs de la pompe à protons doivent être suivies.

## Analyse des paramètres de coagulation

Bien que, d'une façon générale, l'utilisation de ce médicament ne requiert pas de suivi de l'activité anticoagulante en routine, la mesure de l'anticoagulation liée au dabigatran peut être utile en présence de facteurs de risque additionnels pour déceler une exposition excessive au dabigatran.

La mesure du temps de thrombine (TT) dilué, du temps d'écarine (ECT) et du temps de céphaline activée (TCA) peut fournir des informations utiles, mais leurs résultats doivent être interprétés avec prudence (voir rubrique 5.1) en raison de la variabilité entre les tests. La mesure de l'INR (International Normalised Ratio) n'est pas fiable chez les patients traités par dabigatran éxétilate, et des élévations faussement positives de l'INR ont été rapportées. De ce fait, la mesure de l'INR ne doit pas être pratiquée.

Le tableau 5 montre les valeurs seuils, à l'état résiduel, des tests de la coagulation pouvant être associées à un risque accru de saignement chez les patients adultes. Les seuils respectifs pour les patients pédiatriques sont inconnus (voir rubrique 5.1).

**Tableau 5 : Tests de la coagulation (valeurs résiduelles) pouvant être associés à un risque accru de saignement chez les patients adultes.**

| Test (valeur à l'état résiduel)                 | Indication                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                 | Prévention des AVC/ES liés à la FA et TVP/EP |
| TT dilué [ng/mL]                                | > 200                                        |
| ECT [x fois la limite supérieure de la normale] | > 3                                          |
| TCA [x fois la limite supérieure de la normale] | > 2                                          |
| INR                                             | Ne doit pas être pratiqué                    |

## Administration de fibrinolytiques pour le traitement des AVC ischémiques aigus

L'administration de fibrinolytiques pour le traitement des AVC ischémiques aigus peut être envisagée lorsque le patient présente un TT dilué, un temps d'écarine (ECT) ou un TCA ne dépassant pas la limite supérieure de la normale (LSN) selon les fourchettes de référence de chaque laboratoire.

## Actes chirurgicaux et interventions

Les patients sous dabigatran éxétilate qui subissent un acte chirurgical ou des interventions invasives présentent un risque hémorragique accru. Par conséquent, il peut s'avérer nécessaire d'arrêter provisoirement le traitement par dabigatran éxétilate dans le cas d'interventions chirurgicales.

Les patients peuvent poursuivre le dabigatran éxétilate lors d'une cardioversion. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le traitement par dabigatran éxétilate (150 mg deux fois par jour) chez les patients bénéficiant d'une ablation par cathéter de la fibrillation atriale (voir rubrique 4.2).

Une prudence particulière est nécessaire lorsque le traitement est temporairement arrêté pour une intervention chirurgicale et un suivi de l'activité anticoagulante est recommandé. La clairance du dabigatran chez les patients présentant une insuffisance rénale peut être allongée (voir rubrique 5.2). Ceci doit être pris en compte avant toute intervention. Dans ce cas, un test de

coagulation (voir rubriques 4.4 et 5.1) peut aider à déterminer si l'hémostase est toujours modifiée.

### Urgence chirurgicale ou procédures urgentes

Le dabigatran éxilate doit être provisoirement arrêté. L'agent de réversion spécifique du dabigatran (idarucizumab) est disponible pour les patients adultes lorsqu'une réversion rapide de l'effet anticoagulant est requise. L'efficacité et la sécurité de l'idarucizumab n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques. L'hémodialyse permet d'éliminer le dabigatran.

La réversion du traitement par dabigatran expose ces patients au risque thrombotique lié à leur maladie sous-jacente. Le traitement par dabigatran éxilate peut être réintroduit 24 heures après l'administration d'idarucizumab si l'état du patient est cliniquement stable et si une hémostase adéquate a été obtenue.

### Chirurgie/ interventions en urgence différée

Le dabigatran éxilate doit être provisoirement arrêté. Il convient de retarder si possible un acte chirurgical/une intervention au minimum 12 heures après la dernière dose. Si l'intervention ne peut pas être retardée, le risque hémorragique peut être augmenté. Ce risque d'hémorragie doit être mesuré par rapport à l'urgence de l'intervention.

### Chirurgie programmée

Le traitement par dabigatran éxilate doit être arrêté, si possible, au moins pendant 24 heures avant une intervention invasive ou chirurgicale. Chez les patients présentant un risque plus élevé de saignement ou dans les cas de chirurgies majeures où une hémostase complète est nécessaire, un arrêt du traitement par dabigatran éxilate 2 à 4 jours avant l'intervention doit être envisagé.

Le tableau 6 récapitule les règles d'arrêt du traitement avant une intervention invasive ou chirurgicale chez les patients adultes.

Tableau 6 : Règles d'arrêt du traitement avant une intervention invasive ou chirurgicale chez les patients adultes.

| Fonction rénale (ClCr en mL/min) | Demi-vie estimée (heures) | Le dabigatran éxilate doit être arrêté avant une chirurgie programmée |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                           | Risque élevé de saignement ou chirurgie majeure                       | Risque standard               |
| ? 80                             | ~ 13                      | 2 jours avant                                                         | 24 heures avant               |
| ? 50-< 80                        | ~ 15                      | 2-3 jours avant                                                       | 1-2 jours avant               |
| ? 30-< 50                        | ~ 18                      | 4 jours avant                                                         | 2-3 jours avant (> 48 heures) |

Le tableau 7 récapitule les règles d'arrêt du traitement avant une intervention invasive ou chirurgicale chez les patients pédiatriques.

Tableau 7 : Règles d'arrêt du traitement avant une intervention invasive ou chirurgicale chez les patients pédiatriques

| Fonction rénale (DFGe en mL/min/1,73 m <sup>2</sup> ) | Le dabigatran doit être arrêté avant une chirurgie programmée |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| > 80                                                  | 24 heures avant                                               |
| 50 ? 80                                               | 2 jours avant                                                 |

#### Rachianesthésie/anesthésie péridurale/ponction lombaire

Les interventions telles qu'une rachianesthésie peuvent nécessiter une hémostase complète.

Le risque d'hématome rachidien ou épidural peut être augmenté en cas de geste traumatique ou répété et en cas d'utilisation prolongée de cathéters périduraux. Après le retrait d'un cathéter, un intervalle d'au moins 2 heures doit être respecté pour administrer la première dose de dabigatran éxilate. Une surveillance fréquente des signes neurologiques et des symptômes d'hématome rachidien ou épidural est requise chez ces patients.

#### Phase post-opératoire

Le traitement par dabigatran éxilate doit être repris/débuté dès que possible après une procédure invasive ou une intervention chirurgicale à condition que la situation clinique le permette et qu'une hémostase adéquate ait été établie.

Les patients à risque de saignement ou les patients à risque de surexposition, notamment les patients présentant une fonction rénale diminuée (voir également tableau 4), doivent être traités avec prudence (voir rubriques 4.4 et 5.1).

#### Patients à haut risque de mortalité chirurgicale et présentant des facteurs de risque intrinsèques d'événements thromboemboliques

Il existe peu de données disponibles sur l'efficacité et la sécurité du dabigatran éxilate chez ces patients qui doivent donc être traités avec prudence.

#### Insuffisance hépatique

Les patients présentant un taux d'enzymes hépatiques supérieur à 2 fois la limite supérieure de la normale (LSN) ont été exclus des principales études. Aucune expérience clinique n'est disponible pour cette sous-population de patients et l'administration de dabigatran éxilate n'est donc pas recommandée dans cette population. Une insuffisance hépatique ou une maladie hépatique susceptible d'avoir un impact sur la survie sont contre-indiquées (voir rubrique 4.3).

#### Interaction avec les inducteurs de la P-gp

Une diminution des concentrations plasmatiques de dabigatran est attendue en cas d'administration concomitante avec des inducteurs de la P-gp, ce qui doit donc être évité (voir rubriques 4.5 et 5.2).

#### Patients souffrant du syndrome des antiphospholipides

Les anticoagulants oraux à action directe (AOD), dont le dabigatran éxilate, ne sont pas recommandés pour les patients présentant des antécédents de thrombose auxquels on a diagnostiqué un syndrome des antiphospholipides. En particulier pour les patients testés triplement positifs (anticoagulant du lupus, anticorps anticardiolipine et anticorps anti-bêta 2-glycoprotéine I), le traitement par AOD pourrait être associé à des taux d'événements thrombotiques récurrents supérieurs à ceux observés en cas de traitement par un antagoniste de la vitamine K.

#### Infarctus du myocarde (IM)

Dans l'étude de phase III RE-LY (prévention des AVC/ES liés à la FA, voir rubrique 5.1), le taux global d'IM a été respectivement de 0,82 %, 0,81 % et 0,64 % par an dans les groupes dabigatran éxilate 110 mg deux fois par jour, dabigatran éxilate 150 mg deux fois par jour et warfarine ; soit une augmentation du risque relatif pour le dabigatran de 29 % et de 27 % par rapport à la warfarine. Indépendamment du traitement, le risque absolu le plus élevé d'IM a été observé dans les sous-groupes suivants, avec un risque relatif similaire : patients avec antécédent d'IM, patients âgés de 65 ans et plus avec soit un diabète, soit une coronaropathie, patients ayant une fraction d'éjection ventriculaire gauche < à 40 % et patients présentant une insuffisance rénale modérée. De plus, un risque plus élevé d'IM a été observé chez les patients

prenant de façon concomitante de l'AAS (aspirine) et du clopidogrel ou du clopidogrel seul.

Dans les trois études de phase III sur la TVP/EP, contrôlées avec comparateur actif, un taux supérieur d'IM a été rapporté chez les patients ayant reçu du dabigatran éxilate par rapport à ceux ayant reçu de la warfarine : 0,4 % vs 0,2 % au cours des études à court terme RE-COVER et RE-COVER II ; 0,8 % vs 0,1 % au cours de l'étude à long terme RE-MEDY. L'augmentation a été statistiquement significative dans cette étude ( $p = 0,022$ ).

Dans l'étude RE-SONATE, comparant le dabigatran éxilate au placebo, le taux d'IM a été de 0,1 % chez les patients ayant reçu du dabigatran éxilate et de 0,2 % chez les patients ayant reçu le placebo.

Patients atteints de cancer évolutif (TVP/EP, ETEV chez les patients pédiatriques)

L'efficacité et la sécurité n'ont pas été établies chez les patients présentant une TVP/EP atteints de cancer évolutif. Les données sur l'efficacité et la sécurité chez les patients pédiatriques atteints de cancer évolutif sont limitées.

## Population pédiatrique

Chez certains patients pédiatriques très spécifiques (p. ex., patients présentant une maladie de l'intestin grêle pouvant altérer l'absorption), l'utilisation d'un anticoagulant par voie parentérale doit être envisagée.

## 4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

### Interactions avec des transporteurs

Le dabigatran éxilate est un substrat du transporteur d'efflux P-gp. L'administration concomitante d'un inhibiteur de la P-gp (voir tableau 8) devrait augmenter les concentrations plasmatiques de dabigatran.

Bien que non définie spécifiquement, une surveillance clinique étroite (observation des signes de saignement ou d'anémie) est nécessaire lorsque le dabigatran est administré de façon concomitante avec de puissants inhibiteurs de la P-gp. Des diminutions de la posologie peuvent être nécessaires en cas d'association avec certains inhibiteurs de la P-gp (voir rubriques 4.2, 4.3, 4.4 et 5.1).

**Tableau 8 : Interactions avec des transporteurs**

| Inhibiteurs de la P-gp                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation concomitante contre-indiquée (voir rubrique 4.3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kétoconazole                                                 | Le kétoconazole a augmenté les valeurs totales de l'ASC0-? et de la $C_{max}$ du dabigatran respectivement de 2,38 fois et de 2,35 fois après une dose orale unique de 400 mg, et respectivement de 2,53 fois et 2,49 fois après des doses orales multiples de 400 mg de kétoconazole, une fois par jour.                                                                    |
| Dronédarone                                                  | Lorsque le dabigatran éxilate et la dronédarone ont été administrés simultanément, les valeurs totales de l'ASC0-? et de la $C_{max}$ du dabigatran ont augmenté d'environ 2,4 fois et 2,3 fois respectivement, après administration multiple de dronédarone à 400 mg deux fois par jour, et d'environ 2,1 fois et 1,9 fois respectivement, après une dose unique de 400 mg. |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Itraconazole, ciclosporine                                                       | Compte tenu des résultats in vitro, un effet similaire à celui obtenu avec le kétoconazole peut être attendu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glécaprévir/pibrentasvir                                                         | L'utilisation concomitante de dabigatran éxilate avec l'association à dose fixe de glécaprévir/pibrentasvir (inhibiteurs de la P-gp) augmente l'exposition au dabigatran et peut augmenter le risque de saignement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utilisation concomitante non recommandée                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tacrolimus                                                                       | Il a été observé avec le tacrolimus, in vitro, un niveau d'inhibition de la P-gp similaire à celui observé avec l'itraconazole et la ciclosporine. Aucune étude clinique n'a été menée avec le dabigatran éxilate associé au tacrolimus. Cependant, des données cliniques limitées avec un autre substrat de la P-gp (évérolimus) suggèrent que l'inhibition de la P-gp par le tacrolimus est plus faible que celle observée avec des inhibiteurs puissants de la P-gp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prudence à exercer en cas d'utilisation concomitante (voir rubriques 4.2 et 4.4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vérapamil                                                                        | <p>Lorsque le dabigatran éxilate (150 mg) a été co-administré à du vérapamil par voie orale, la <math>C_{\max}</math> et l'ASC du dabigatran ont été augmentées mais l'amplitude de cette modification diffère en fonction du moment de l'administration et de la formulation du vérapamil (voir rubriques 4.2 et 4.4).</p> <p>La plus grande augmentation de l'exposition au dabigatran a été observée avec la première dose d'une formulation à libération immédiate de vérapamil administrée une heure avant la prise de dabigatran éxilate (augmentation de la <math>C_{\max}</math> d'environ 2,8 fois et de l'ASC d'environ 2,5 fois). L'effet a été progressivement diminué lors de l'administration d'une formulation à libération prolongée (augmentation de la <math>C_{\max}</math> d'environ 1,9 fois et de l'ASC d'environ 1,7 fois) ou lors de l'administration de doses multiples de vérapamil (augmentation de la <math>C_{\max}</math> d'environ 1,6 fois et de l'ASC d'environ 1,5 fois).</p> <p>Aucune interaction significative n'a été observée lorsque le vérapamil était administré 2 heures après la prise de dabigatran éxilate (augmentation de la <math>C_{\max}</math> d'environ 1,1 fois et de l'ASC d'environ 1,2 fois). Ceci s'explique par l'absorption complète du dabigatran après 2 heures.</p> |
| Amiodarone                                                                       | Lors de l'administration concomitante de dabigatran éxilate et d'une dose unique de 600 mg d'amiodarone par voie orale, l'étendue et le taux de l'absorption de l'amiodarone et de son métabolite actif DEA sont demeurés principalement inchangés. L'ASC et la $C_{\max}$ du dabigatran ont respectivement augmenté d'environ 1,6 fois et 1,5 fois. En raison de la longue demi-vie de l'amiodarone, la possibilité d'une interaction persiste pendant plusieurs semaines après l'arrêt de l'amiodarone (voir rubriques 4.2 et 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quinidine                                   | La quinidine a été administrée à la dose de 200 mg toutes les 2 heures jusqu'à une dose totale de 1 000 mg. Le dabigatran éxilate a été donné deux fois par jour pendant 3 jours consécutifs, le 3 <sup>e</sup> jour avec ou sans quinidine. L'ASC <sub>?,ss</sub> et la C <sub>max,ss</sub> du dabigatran étaient augmentées en moyenne respectivement de 1,53 fois et 1,56 fois avec l'utilisation concomitante de quinidine (voir rubriques 4.2 et 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clarithromycine                             | Lorsque la clarithromycine (500 mg deux fois par jour) a été administrée en même temps que le dabigatran éxilate chez des volontaires sains, une augmentation de l'ASC d'environ 1,19 fois et de la C <sub>max</sub> d'environ 1,15 fois a été observée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ticagrélor                                  | <p>Lorsqu'une dose unique de 75 mg de dabigatran éxilate a été administrée simultanément avec une dose de charge de 180 mg de ticagrélor, l'ASC et la C<sub>max</sub> du dabigatran ont augmenté respectivement de 1,73 fois et 1,95 fois. Après des doses multiples de ticagrélor de 90 mg deux fois par jour, l'augmentation de l'exposition au dabigatran est respectivement de 1,56 fois et 1,46 fois pour la C<sub>max</sub> et l'ASC.</p> <p>Une administration concomitante d'une dose de charge de 180 mg de ticagrélor et de 110 mg de dabigatran éxilate (à l'état d'équilibre) augmente les valeurs d'ASC<sub>?,ss</sub> et de C<sub>max,ss</sub> du dabigatran respectivement de 1,49 fois et 1,65 fois, par rapport au dabigatran éxilate administré seul. Quand une dose de charge de 180 mg de ticagrélor est donnée 2 heures après l'administration de 110 mg de dabigatran éxilate (à l'état d'équilibre), l'augmentation des valeurs d'ASC<sub>?,ss</sub> et de C<sub>max,ss</sub> du dabigatran se réduit à 1,27 fois et 1,23 fois respectivement, par rapport au dabigatran éxilate administré seul. Cette prise décalée est recommandée pour démarrer l'administration de ticagrélor avec une dose de charge.</p> <p>L'administration concomitante de 90 mg de ticagrélor 2 fois par jour (dose d'entretien) et de 110 mg de dabigatran éxilate augmente les valeurs ajustées d'ASC<sub>?,ss</sub> et de C<sub>max,ss</sub> du dabigatran de respectivement 1,26 fois et 1,29 fois, par rapport au dabigatran éxilate administré seul.</p> |
| Posaconazole                                | Le posaconazole inhibe également la P-gp dans une certaine mesure, mais cela n'a pas été étudié au cours d'essais cliniques. La prudence est nécessaire lorsque le dabigatran éxilate est administré de façon concomitante au posaconazole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inducteurs de la P-gp                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utilisation concomitante devant être évitée |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tels que<br>Rifampicine,<br>Millepertuis<br>(Hypericum<br>perforatum),<br>Carbamazépine<br>ou Phénytoïne | L'administration concomitante devrait entraîner une diminution des concentrations de dabigatran.<br><br>Un pré-traitement de rifampicine, inducteur puissant, à la dose de 600 mg une fois par jour pendant 7 jours a diminué le pic total de dabigatran et l'exposition totale respectivement de 65,5 et 67 %. Au 7 <sup>e</sup> jour d'arrêt du traitement par la rifampicine, l'effet inducteur était diminué entraînant une exposition au dabigatran proche de la valeur standard. Aucune augmentation supplémentaire de la biodisponibilité n'a été observée après 7 jours de plus. |
| Inhibiteurs de protéase tels que le ritonavir                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utilisation concomitante non recommandée                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tels que<br>Ritonavir, seul<br>ou en<br>association<br>avec d'autres<br>inhibiteurs de la<br>protéase    | Ils ont une incidence sur la P-gp (soit comme inhibiteur ou comme inducteur). Ils n'ont pas été étudiés et ne sont par conséquent pas recommandés en traitement concomitant avec le dabigatran éxilate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Substrat de la P-gp                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Digoxine                                                                                                 | Dans une étude chez 24 sujets sains, lors de l'administration concomitante de dabigatran éxilate et de digoxine, aucun changement concernant l'exposition à la digoxine, et aucune modification cliniquement significative concernant l'exposition au dabigatran n'ont été observés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Anticoagulants et antiagrégants plaquettaires

Il n'existe aucune expérience ou seulement une expérience limitée avec les traitements suivants, susceptibles d'augmenter le risque hémorragique lorsqu'ils sont administrés de façon concomitante avec le dabigatran éxilate : anticoagulants tels que les héparines non fractionnées (HNF), héparines de bas poids moléculaire (HBPM) et dérivés de l'héparine (fondaparinux, désirudine), thrombolytiques, antivitamines K, rivaroxaban ou autres anticoagulants oraux (voir rubrique 4.3) et antiagrégants plaquettaires tels que les antagonistes des récepteurs GPIIb/IIIa, la ticlopidine, le prasugrel, le ticagrélor, le dextran et la sulfinpyrazone (voir rubrique 4.4).

À partir des données limitées recueillies dans l'étude de phase III RE-LY (voir rubrique 5.1), il a été observé que l'administration concomitante d'autres anticoagulants par voie orale ou parentérale augmente les taux de saignement majeur à la fois avec le dabigatran éxilate et la warfarine, d'environ 2,5 fois, principalement en cas de changement d'un anticoagulant pour un autre (voir rubrique 4.3). En outre, un traitement concomitant par antiagrégant plaquettaire, AAS ou clopidogrel, pouvait environ doubler le risque d'hémorragie majeure à la fois avec le dabigatran éxilate et la warfarine (voir rubrique 4.4).

Les HNF peuvent être administrées à des doses nécessaires au maintien de la perméabilité d'un cathéter central artériel ou veineux ou pendant l'ablation par cathéter de la fibrillation atriale (voir rubrique 4.3).

Tableau 9 : Interactions avec les anticoagulants et antiagrégants plaquettaires

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AINS            | Les AINS administrés pour une analgésie de courte durée n'ont pas été associés à une augmentation du risque hémorragique en cas d'administration avec le dabigatran éxilate. En administration prolongée dans l'étude RE-LY, les AINS ont augmenté le risque hémorragique d'environ 50 % pour le dabigatran éxilate et la warfarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Clopidogrel     | Chez de jeunes hommes volontaires sains, l'administration concomitante de dabigatran éxilate et de clopidogrel n'a pas entraîné d'allongement supplémentaire des temps de saignement capillaire par rapport au clopidogrel en monothérapie. De plus, les valeurs d'ASC <sub>2,ss</sub> et de C <sub>max,ss</sub> du dabigatran ainsi que les tests de la coagulation mesurant l'effet du dabigatran, ou l'inhibition de l'agrégation plaquettaire mesurant l'effet du clopidogrel n'ont quasiment pas été modifiés entre le traitement combiné et les monothérapies respectives. Avec une dose de charge de 300 mg ou 600 mg de clopidogrel, les valeurs d'ASC <sub>2,ss</sub> et de C <sub>max,ss</sub> du dabigatran ont augmenté d'environ 30 à 40 % (voir rubrique 4.4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AAS<br><br>HBPM | L'administration concomitante d'AAS et de 150 mg de dabigatran éxilate deux fois par jour peut augmenter le risque de saignement de tout type de 12 % à 18 % (avec 81 mg d'AAS) et de 12 % à 24 % (avec 325 mg d'AAS) (voir rubrique 4.4).<br><br>L'utilisation concomitante d'HBPM, telle que l'énoxaparine, et de dabigatran éxilate n'a pas fait l'objet d'étude spécifique. Après l'administration sur 3 jours de 40 mg d'énoxaparine s.c. une fois par jour, l'exposition au dabigatran 24 heures après la dernière dose d'énoxaparine, était légèrement inférieure à celle observée après l'administration de dabigatran éxilate seul (dose unique de 220 mg). Une activité anti-FXa/FIIa plus élevée a été observée après l'administration de dabigatran éxilate associée à un pré-traitement par énoxaparine par rapport à celle observée après un traitement par dabigatran éxilate seul. Cela serait dû à un effet rémanent du traitement par énoxaparine, et n'est pas considéré comme pertinent cliniquement. Le pré-traitement par énoxaparine n'a pas eu d'effet significatif sur d'autres tests d'anticoagulation liés au dabigatran. |

#### Autres interactions

**Tableau 10 : Autres interactions**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la norépinephrine (ISRN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ISRS, ISRN                                                                                                                                             | Les ISRS et les ISRN ont augmenté le risque de saignement dans l'étude RE-LY, dans tous les groupes de traitement.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Substances influençant le pH gastrique                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pantoprazole                                                                                                                                           | Une diminution d'environ 30 % de l'ASC du dabigatran a été observée après administration concomitante de dabigatran éxilate et de pantoprazole. Au cours d'essais cliniques, le pantoprazole et d'autres inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ont été administrés conjointement au dabigatran éxilate sans que cela ne se traduise par une diminution de l'efficacité du dabigatran éxilate. |

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ranitidine | Aucun effet cliniquement significatif sur l'étendue de l'absorption du dabigatran n'a été observé après l'administration concomitante de dabigatran éxilate et de ranitidine. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Interactions liées au profil métabolique du dabigatran éxilate et du dabigatran

Le dabigatran éxilate et le dabigatran ne sont pas métabolisés par le système du cytochrome P450 et n'exercent aucun effet in vitro sur les enzymes du cytochrome P450 humain. Des interactions médicamenteuses liées à ce système ne sont donc pas attendues avec le dabigatran.

#### **Population pédiatrique**

Les études d'interaction n'ont été réalisées que chez l'adulte.

### **4.6. Fertilité, grossesse et allaitement**

#### **Femmes en âge de procréer**

Les femmes en âge de procréer doivent éviter une grossesse au cours d'un traitement par dabigatran éxilate.

#### **Grossesse**

Il existe des données limitées sur l'utilisation de dabigatran éxilate chez la femme enceinte. Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction (voir rubrique 5.3). Le risque potentiel chez l'humain n'est pas connu.

Dabigatran éxilate ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse sauf nécessité absolue.

#### **Allaitement**

Il n'existe aucune donnée clinique sur l'effet du dabigatran chez le nourrisson allaité au sein. L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement avec dabigatran éxilate.

#### **Fertilité**

Aucune donnée disponible chez l'être humain.

Dans des études chez l'animal, un effet sur la fertilité des femelles a été observé sous la forme d'une diminution des implantations et d'une augmentation des pertes pré-implantatoires chez les femelles exposées à 70 mg/kg (représentant un taux d'exposition plasmatique 5 fois plus élevé par rapport à celui des patients). Aucun autre effet sur la fertilité des femelles n'a été observé. La fertilité des mâles n'a pas été affectée. À des doses toxiques pour les mères (représentant une exposition plasmatique 5 à 10 fois supérieure à celle des patients), une diminution du poids corporel des fœtus et de la viabilité embryofœtale ainsi qu'une augmentation des modifications fœtales ont été observées chez le rat et le lapin. Dans une étude pré- et post-natale, une augmentation de la mortalité fœtale a été observée à des doses toxiques pour les mères (dose correspondant à un niveau d'exposition plasmatique 4 fois plus élevé que celui observé chez les patients).

### **4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

Le dabigatran éxilate n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

#### 4.8. Effets indésirables

##### Résumé du profil de sécurité d'emploi

Le dabigatran éxilate a été évalué dans des essais cliniques menés chez approximativement 64 000 patients au total, parmi lesquels environ 35 000 patients ont reçu le dabigatran éxilate. Au total, 22 % des patients présentant une fibrillation atriale traités pour la prévention de l'AVC et de l'embolie systémique (traitement à long terme allant jusqu'à 3 ans), 14 % des patients traités pour une TVP/EP et 15 % des patients traités pour la prévention d'une TVP/EP ont présenté des effets indésirables.

Les événements les plus fréquemment rapportés ont été des saignements, survenus chez environ 16,6 % des patients présentant une fibrillation atriale traités au long cours en prévention de l'AVC et de l'embolie systémique, et chez 14,4 % des patients adultes traités pour une TVP/EP. En outre, des saignements sont survenus chez 19,4 % des patients au cours de l'étude RE-MEDY (patients adultes) sur la prévention de la TVP/EP et chez 10,5 % des patients au cours de l'étude RE-SONATE (patients adultes).

Dans la mesure où les populations de patients traités dans les trois indications ne sont pas comparables et où les événements hémorragiques sont répartis dans divers systèmes classe organe (SOC), un résumé des hémorragies majeures et des hémorragies de tout type classées par indication est présenté dans les tableaux 12 à 15 ci-dessous.

Bien que de fréquence faible dans les essais cliniques, des saignements majeurs ou sévères peuvent survenir et, indépendamment de la localisation, peuvent conduire à une invalidité, à une menace du pronostic vital, voire même au décès.

##### Tableau résumé des effets indésirables

Le tableau 11 présente les effets indésirables identifiés lors des études et issus des données post-marketing dans les indications de prévention de l'AVC d'origine thromboembolique et de l'embolie systémique chez les patients présentant une fibrillation atriale, et de traitement et de prévention de la TVP/EP. Ils sont classés par système classe organe (SOC) et fréquence selon la convention suivante : très fréquent (? 1/10) ; fréquent (? 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (? 1/1 000, < 1/100) ; rare (? 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

**Tableau 11 : Effets indésirables**

| Système classe organe/terme préférentiel            | Fréquence                                                                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                     | Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation atriale | Traitement et prévention de la TVP/EP |
| Affections hématologiques et du système lymphatique |                                                                                                   |                                       |
| Anémie                                              | Fréquent                                                                                          | Peu fréquent                          |
| Diminution de l'hémoglobine                         | Peu fréquent                                                                                      | Fréquence indéterminée                |
| Thrombopénie                                        | Peu fréquent                                                                                      | Rare                                  |
| Diminution de l'hématocrite                         | Rare                                                                                              | Fréquence indéterminée                |
| Neutropénie                                         | Fréquence indéterminée                                                                            | Fréquence indéterminée                |

|                                                           | Fréquence                                                                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Système classe organe/terme préférentiel                  | Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation atriale | Traitement et prévention de la TVP/EP |
| Agranulocytose                                            | Fréquence indéterminée                                                                            | Fréquence indéterminée                |
| Affections du système immunitaire                         |                                                                                                   |                                       |
| Hypersensibilité médicamenteuse                           | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Rash                                                      | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Prurit                                                    | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Réaction anaphylactique                                   | Rare                                                                                              | Rare                                  |
| Angio-œdème                                               | Rare                                                                                              | Rare                                  |
| Urticaire                                                 | Rare                                                                                              | Rare                                  |
| Bronchospasme                                             | Fréquence indéterminée                                                                            | Fréquence indéterminée                |
| Affections du système nerveux                             |                                                                                                   |                                       |
| Hémorragie intracrânienne                                 | Peu fréquent                                                                                      | Rare                                  |
| Affections vasculaires                                    |                                                                                                   |                                       |
| Hématome                                                  | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Hémorragie                                                | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales    |                                                                                                   |                                       |
| Épistaxis                                                 | Fréquent                                                                                          | Fréquent                              |
| Hémoptysie                                                | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Affections gastro-intestinales                            |                                                                                                   |                                       |
| Hémorragie gastro-intestinale                             | Fréquent                                                                                          | Fréquent                              |
| Douleurs abdominales                                      | Fréquent                                                                                          | Peu fréquent                          |
| Diarrhée                                                  | Fréquent                                                                                          | Peu fréquent                          |
| Dyspepsie                                                 | Fréquent                                                                                          | Fréquent                              |
| Nausée                                                    | Fréquent                                                                                          | Peu fréquent                          |
| Hémorragie rectale                                        | Peu fréquent                                                                                      | Fréquent                              |
| Hémorragie hémorroïdaire                                  | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Ulcère gastro-intestinal, incluant l'ulcère de l'œsophage | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Gastro-œsophagite                                         | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |

|                                                                               | Fréquence                                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Système classe organe/terme préférentiel                                      | Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation atriale | Traitement et prévention de la TVP/EP |
| Reflux gastro-<br>?sophagien                                                  | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Vomissements                                                                  | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Dysphagie                                                                     | Peu fréquent                                                                                      | Rare                                  |
| Affections hépatobiliaires                                                    |                                                                                                   |                                       |
| Anomalie de la fonction hépatique/anomalie des tests de la fonction hépatique | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Augmentation de l'alanine aminotransférase                                    | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Augmentation de l'aspartate aminotransférase                                  | Peu fréquent                                                                                      | Peu fréquent                          |
| Augmentation des enzymes hépatiques                                           | Rare                                                                                              | Peu fréquent                          |
| Hyperbilirubinémie                                                            | Rare                                                                                              | Fréquence indéterminée                |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané                                 |                                                                                                   |                                       |
| Hémorragie cutanée                                                            | Fréquent                                                                                          | Fréquent                              |
| Alopécie                                                                      | Fréquence indéterminée                                                                            | Fréquence indéterminée                |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques                               |                                                                                                   |                                       |
| Hémarthrose                                                                   | Rare                                                                                              | Peu fréquent                          |
| Affections du rein et des voies urinaires                                     |                                                                                                   |                                       |
| Hémorragie du tractus uro-génital, incluant l'hématurie                       | Fréquent                                                                                          | Fréquent                              |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration                       |                                                                                                   |                                       |
| Hémorragie au site d'injection                                                | Rare                                                                                              | Rare                                  |
| Hémorragie au site d'un cathéter                                              | Rare                                                                                              | Rare                                  |
| Lésions, intoxications et complications liées aux procédures                  |                                                                                                   |                                       |
| Hémorragie traumatique                                                        | Rare                                                                                              | Peu fréquent                          |
| Hémorragie au site d'incision                                                 | Rare                                                                                              | Rare                                  |

Description de certains effets indésirables

## Réactions hémorragiques

En raison du mode d'action pharmacologique, l'utilisation du dabigatran éxexilate peut être associée à une augmentation du risque de saignement occulte ou visible d'un tissu ou d'un organe. Les signes, les symptômes et la sévérité (y compris l'issue fatale) seront différents en fonction du site et du degré ou de l'étendue du saignement et/ou de l'anémie. Dans des études cliniques, des saignements des muqueuses (par exemple gastro-intestinales, uro-génitales) ont été plus fréquemment observés lors d'un traitement à long terme par dabigatran éxexilate comparé à un traitement par AVK.

C'est pourquoi, en plus d'une surveillance clinique adéquate, les tests de laboratoire évaluant l'hémoglobine/hématocrite peuvent aider à déceler les saignements occultes. Le risque de saignement peut être accru dans certains groupes de patients, notamment les patients présentant une insuffisance rénale modérée et/ou sous traitement concomitant influençant l'hémostase ou par des inhibiteurs puissants de la P-gp (voir rubrique 4.4 Risque hémorragique). Les complications hémorragiques peuvent se manifester par une faiblesse, une pâleur, un étourdissement, des maux de tête ou un gonflement inexpliqué, une dyspnée et un choc inexpliqué.

Des complications hémorragiques connues, telles qu'un syndrome des loges, une insuffisance rénale aiguë suite à une hypoperfusion et une néphropathie liée aux anticoagulants chez les patients présentant des facteurs de risque prédisposants, ont été rapportées avec le dabigatran éxexilate. Il convient dès lors d'envisager la possibilité d'une hémorragie lorsque l'on évalue l'état d'un patient sous anticoagulant. Pour les patients adultes, il existe un agent de réversion spécifique du dabigatran, l'idarucizumab, disponible en cas de saignement incontrôlable (voir rubrique 4.9).

### Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque (prévention des AVC/ES liés à la FA)

Le tableau 12 présente les événements hémorragiques classés en hémorragies majeures et hémorragies de tout type au cours de l'étude pivot qui a évalué la prévention de l'AVC d'origine thromboembolique et de l'embolie systémique chez les patients présentant une fibrillation atriale.

Tableau 12 : Événements hémorragiques au cours d'une étude évaluant la prévention de l'AVC d'origine thromboembolique et de l'embolie systémique chez les patients présentant une fibrillation atriale

|                           | Dabigatran éxexilate 110 mg deux fois par jour | Dabigatran éxexilate 150 mg deux fois par jour | Warfarine       |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Sujets randomisés         | 6 015                                          | 6 076                                          | 6 022           |
| Hémorragies majeures      | 347 (2,92 %)                                   | 409 (3,40 %)                                   | 426 (3,61 %)    |
| Hémorragie intracrânienne | 27 (0,23 %)                                    | 39 (0,32 %)                                    | 91 (0,77 %)     |
| Hémorragie GI             | 134 (1,13 %)                                   | 192 (1,60 %)                                   | 128 (1,09 %)    |
| Hémorragie fatale         | 26 (0,22 %)                                    | 30 (0,25 %)                                    | 42 (0,36 %)     |
| Hémorragies mineures      | 1 566 (13,16 %)                                | 1 787 (14,85 %)                                | 1 931 (16,37 %) |
| Hémorragies de tout type  | 1 759 (14,78 %)                                | 1 997 (16,60 %)                                | 2 169 (18,39 %) |

Les patients randomisés dans le groupe dabigatran éxexilate 110 mg deux fois par jour ou 150 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement inférieur d'hémorragies menaçant le pronostic vital et d'hémorragies intracrâniennes par rapport aux patients sous warfarine [ $p <$

0,05]. Le dabigatran éxilate aux deux doses présentait également un taux global de saignements significativement plus faible. Les patients affectés par randomisation à un traitement par dabigatran éxilate 110 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement inférieur d'hémorragies majeures par rapport aux patients sous warfarine (hazard ratio de 0,81 [p = 0,0027]). Les patients randomisés dans le groupe dabigatran éxilate 150 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement plus élevé d'hémorragies GI majeures par rapport aux patients sous warfarine (hazard ratio de 1,48 [p = 0,0005]). Cet effet a été principalement observé chez les patients > 75 ans. Le bénéfice clinique du dabigatran dans la prévention de l'AVC et de l'embolie systémique ainsi que la diminution du risque d'hémorragie intracrânienne par rapport à la warfarine est maintenu dans les sous-groupes, par exemple en fonction de l'insuffisance rénale, de l'âge, de l'utilisation concomitante de médicaments tels que des antiagrégants plaquettaires ou des inhibiteurs de la P-gp. Alors que certains sous-groupes de patients sont exposés à un risque majoré d'hémorragies majeures lorsqu'ils sont traités par un anticoagulant, le risque accru de saignement pour le dabigatran est dû aux hémorragies GI, généralement observées dans les 3-6 premiers mois suivants l'initiation du traitement par dabigatran éxilate.

Traitement des TVP et des EP et prévention des récives de TVP et d'EP chez l'adulte (traitement de la TVP/EP)

Le tableau 13 présente les événements hémorragiques survenus au cours des études pivots poolées RE-COVER et RE-COVER II portant sur le traitement de la TVP et de l'EP. Au cours des études poolées, les critères principaux de sécurité (hémorragie majeure, hémorragie majeure ou cliniquement significative et hémorragie de tout type) ont été significativement inférieurs par rapport à la warfarine à un niveau alpha nominal de 5 %.

Tableau 13 : Événements hémorragiques survenus au cours des études RE-COVER et RE-COVER II portant sur le traitement de la TVP et de l'EP

|                                                                                        | Dabigatran<br>éxilate 150 mg<br>deux fois par jour | Warfarine    | Hazard ratio vs<br>warfarine<br>(intervalle de<br>confiance à 95<br>%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Patients inclus dans<br>l'analyse de sécurité                                          | 2,456                                              | 2,462        |                                                                        |
| Événements<br>hémorragiques majeurs                                                    | 24 (1,0 %)                                         | 40 (1,6 %)   | 0,60 (0,36, 0,99)                                                      |
| Hémorragie<br>intracrânienne                                                           | 2 (0,1 %)                                          | 4 (0,2 %)    | 0,50 (0,09, 2,74)                                                      |
| Hémorragie GI<br>majeure                                                               | 10 (0,4 %)                                         | 12 (0,5 %)   | 0,83 (0,36, 1,93)                                                      |
| Hémorragie menaçant<br>le pronostic vital                                              | 4 (0,2 %)                                          | 6 (0,2 %)    | 0,66 (0,19, 2,36)                                                      |
| Événements<br>hémorragiques majeurs /<br>hémorragies<br>cliniquement<br>significatives | 109 (4,4 %)                                        | 189 (7,7 %)  | 0,56 (0,45, 0,71)                                                      |
| Hémorragies de tout type                                                               | 354 (14,4 %)                                       | 503 (20,4 %) | 0,67 (0,59, 0,77)                                                      |
| Tout type<br>d'hémorragie GI                                                           | 70 (2,9 %)                                         | 55 (2,2 %)   | 1,27 (0,90, 1,82)                                                      |



Les événements hémorragiques des deux traitements ont été comptabilisés à partir de la première prise de dabigatran éxilate ou de warfarine, après que le traitement par voie parentérale a été interrompu (période de traitement par voie orale uniquement). Cela inclut tous les événements hémorragiques survenus au cours du traitement par dabigatran éxilate. Tous les événements hémorragiques qui sont survenus au cours du traitement par la warfarine sont également inclus, à l'exception de ceux observés au cours de la période de chevauchement entre la warfarine et le traitement par voie parentérale.

Le tableau 14 présente les événements hémorragiques survenus au cours de l'étude pivot RE-MEDY portant sur la prévention de la TVP et de l'EP. Certains événements hémorragiques (événements hémorragiques majeurs [EHM]/événements hémorragiques cliniquement significatifs [EHCS], hémorragies de tout type) ont été significativement inférieurs à un niveau alpha nominal de 5 % chez les patients recevant du dabigatran éxilate par rapport à ceux traités par la warfarine.

Tableau 14 : Événements hémorragiques survenus au cours de l'étude RE-MEDY portant sur la prévention de la TVP et de l'EP

|                                                                                        | Dabigatran<br>éxilate 150 mg<br>deux fois par jour | Warfarine    | Hazard ratio vs<br>warfarine<br>(intervalle de<br>confiance à 95<br>%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Patients traités                                                                       | 1,430                                              | 1,426        |                                                                        |
| Événements<br>hémorragiques majeurs                                                    | 13 (0,9 %)                                         | 25 (1,8 %)   | 0,54 (0,25, 1,16)                                                      |
| Hémorragie<br>intracrânienne                                                           | 2 (0,1 %)                                          | 4 (0,3 %)    | Non calculable*                                                        |
| Hémorragie GI<br>majeure                                                               | 4 (0,3%)                                           | 8 (0,5%)     | Non calculable*                                                        |
| Hémorragie<br>menaçant le<br>pronostic vital                                           | 1 (0,1 %)                                          | 3 (0,2 %)    | Non calculable*                                                        |
| Événements<br>hémorragiques majeurs<br>/ hémorragies<br>cliniquement<br>significatives | 80 (5,6 %)                                         | 145 (10,2 %) | 0,55 (0,41, 0,72)                                                      |
| Hémorragies de tout<br>type                                                            | 278 (19,4 %)                                       | 373 (26,2 %) | 0,71 (0,61, 0,83)                                                      |
| Tout type<br>d'hémorragie GI                                                           | 45 (3,1%)                                          | 32 (2,2%)    | 1,39 (0,87, 2,20)                                                      |

\* Le hazard ratio ne peut pas être estimé car aucun événement n'est survenu dans l'une ou l'autre des cohortes/avec l'un ou l'autre des traitements. Le tableau 15 présente les événements hémorragiques survenus au cours de l'étude pivot RE-SONATE portant sur la prévention de la TVP et de l'EP. Les taux des EHM/EHCS combinées et des hémorragies de tout type ont été significativement inférieurs à un niveau alpha nominal de 5 % chez les patients recevant le placebo par rapport à ceux traités par dabigatran éxilate.

Tableau 15 : Événements hémorragiques survenus au cours de l'étude RE-SONATE portant sur la prévention de la TVP et de l'EP

|                                                                                        | Dabigatran<br>étexilate 150 mg<br>deux fois par jour | Placebo    | Hazard ratio vs<br>placebo (intervalle<br>de confiance à 95<br>%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Patients traités                                                                       | 684                                                  | 659        |                                                                   |
| Événements<br>hémorragiques<br>majeurs                                                 | 2 (0,3 %)                                            | 0          | Non calculable*                                                   |
| Hémorragie<br>intracrânienne                                                           | 0                                                    | 0          | Non calculable*                                                   |
| Hémorragie GI<br>majeure                                                               | 2 (0,3 %)                                            | 0          | Non calculable*                                                   |
| Hémorragie<br>menaçant le<br>pronostic vital                                           | 0                                                    | 0          | Non calculable*                                                   |
| Événements<br>hémorragiques<br>majeurs / hémorragies<br>cliniquement<br>significatives | 36 (5,3 %)                                           | 13 (2,0 %) | 2,69 (1,43 ; 5,07)                                                |
| Hémorragies de tout<br>type                                                            | 72 (10,5 %)                                          | 40 (6,1 %) | 1,77 (1,20 ; 2,61)                                                |
| Tout type<br>d'hémorragie GI                                                           | 5 (0,7 %)                                            | 2 (0,3 %)  | 2,38 (0,46 ; 12,27)                                               |

\* Le hazard ratio ne peut pas être estimé car aucun événement n'est survenu avec l'un ou l'autre traitement.

### Agranulocytose et neutropénie

De très rares cas d'agranulocytose et de neutropénie ont été observés après la commercialisation du dabigatran étexilate. Ces effets indésirables ayant été rapportés dans le cadre de la pharmacovigilance à partir d'une population de taille inconnue, leur fréquence ne peut être établie de manière fiable. Le taux d'événements déclarés a été estimé à 7 événements par million de patients-années pour l'agranulocytose, et à 5 événements par million de patients-années pour la neutropénie.

#### **Population pédiatrique**

La sécurité du dabigatran étexilate dans le traitement des ETEV et la prévention des récurrences d'ETEV chez les patients pédiatriques a été étudiée dans le cadre de deux essais de phase III (DIVERSITY et 1160.108). Au total, 328 patients pédiatriques ont reçu du dabigatran étexilate. Les patients ont reçu une formulation de dabigatran étexilate adaptée à leur âge, à des doses calculées en fonction de leur âge et de leur poids.

Le profil de sécurité attendu chez l'enfant devrait être globalement comparable à celui des adultes.

Au total, 26 % des patients pédiatriques traités par dabigatran étexilate pour un ETEV ou en prévention de récurrences d'ETEV ont présenté des effets indésirables.

### Tableau résumé des effets indésirables

Le tableau 16 présente les effets indésirables identifiés lors des études portant sur le traitement des ETEV et sur la prévention des récurrences d'ETEV chez des patients pédiatriques. Ils sont classés par système classe organe (SOC) et fréquence selon la convention suivante : très fréquent (? 1/10) ; fréquent (? 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (? 1/1 000, < 1/100) ; rare (? 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

**Tableau 16 : Effets indésirables**

|                                                        | Fréquence                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Système classe organe/terme préférentiel               | Traitement des ETEV et prévention des récurrences d'ETEV chez les patients pédiatriques |
| Affections hématologiques et du système lymphatique    |                                                                                         |
| Anémie                                                 | Fréquent                                                                                |
| Diminution de l'hémoglobine                            | Peu fréquent                                                                            |
| Thrombopénie                                           | Fréquent                                                                                |
| Diminution de l'hématocrite                            | Peu fréquent                                                                            |
| Neutropénie                                            | Peu fréquent                                                                            |
| Agranulocytose                                         | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Affections du système immunitaire                      |                                                                                         |
| Hypersensibilité médicamenteuse                        | Peu fréquent                                                                            |
| Rash                                                   | Fréquent                                                                                |
| Prurit                                                 | Peu fréquent                                                                            |
| Réaction anaphylactique                                | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Angio-œdème                                            | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Urticaire                                              | Fréquent                                                                                |
| Bronchospasme                                          | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Affections du système nerveux                          |                                                                                         |
| Hémorragie intracrânienne                              | Peu fréquent                                                                            |
| Affections vasculaires                                 |                                                                                         |
| Hématome                                               | Fréquent                                                                                |
| Hémorragie                                             | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales |                                                                                         |
| Épistaxis                                              | Fréquent                                                                                |
| Hémoptysie                                             | Peu fréquent                                                                            |
| Affections gastro-intestinales                         |                                                                                         |
| Hémorragie gastro-intestinale                          | Peu fréquent                                                                            |
| Douleurs abdominales                                   | Peu fréquent                                                                            |
| Diarrhée                                               | Fréquent                                                                                |
| Dyspepsie                                              | Fréquent                                                                                |
| Nausée                                                 | Fréquent                                                                                |

|                                                                               | Fréquence                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Système classe organe/terme préférentiel                                      | Traitement des ETEV et prévention des récurrences d'ETEV chez les patients pédiatriques |
| Hémorragie rectale                                                            | Peu fréquent                                                                            |
| Hémorragie hémorroïdaire                                                      | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Ulcère gastro-intestinal, incluant l'ulcère de l'œsophage                     | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Gastro-œsophagite                                                             | Peu fréquent                                                                            |
| Reflux gastro-œsophagien                                                      | Fréquent                                                                                |
| Vomissements                                                                  | Fréquent                                                                                |
| Dysphagie                                                                     | Peu fréquent                                                                            |
| Affections hépatobiliaires                                                    |                                                                                         |
| Anomalie de la fonction hépatique/anomalie des tests de la fonction hépatique | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Augmentation de l'alanine aminotransférase                                    | Peu fréquent                                                                            |
| Augmentation de l'aspartate aminotransférase                                  | Peu fréquent                                                                            |
| Augmentation des enzymes hépatiques                                           | Fréquent                                                                                |
| Hyperbilirubinémie                                                            | Peu fréquent                                                                            |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané                                 |                                                                                         |
| Hémorragie cutanée                                                            | Peu fréquent                                                                            |
| Alopécie                                                                      | Fréquent                                                                                |
| Affections musculo-squelettiques et systémiques                               |                                                                                         |
| Hémarthrose                                                                   | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Affections du rein et des voies urinaires                                     |                                                                                         |
| Hémorragie du tractus urogénital, incluant l'hématurie                        | Peu fréquent                                                                            |
| Troubles généraux et anomalies au site d'administration                       |                                                                                         |
| Hémorragie au site d'injection                                                | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Hémorragie au site d'un cathéter                                              | Fréquence indéterminée                                                                  |
| Lésions, intoxications et complications liées aux procédures                  |                                                                                         |
| Hémorragie traumatique                                                        | Peu fréquent                                                                            |
| Hémorragie au site d'incision                                                 | Fréquence indéterminée                                                                  |

#### Réactions hémorragiques

Dans les deux essais de phase III portant sur l'indication de traitement des ETEV et de prévention des récurrences d'ETEV chez des patients pédiatriques, au total, 7 patients (2,1 %) ont

présenté un événement hémorragique majeur, 5 patients (1,5 %) un événement hémorragique non majeur mais cliniquement pertinent et 75 patients (22,9 %) un événement hémorragique mineur. D'une manière générale, les événements hémorragiques étaient plus fréquents dans le groupe d'âge le plus élevé (12 à < 18 ans : 28,6 %) que dans les groupes d'âge inférieurs (0 à < 2 ans : 23,3 % ; 2 à < 12 ans : 16,2 %). Des saignements majeurs ou sévères peuvent conduire à une invalidité, à une menace du pronostic vital, voire même au décès, indépendamment de la localisation.

### **Déclaration des effets indésirables suspectés**

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

### **4.9. Surdosage**

L'administration de doses de dabigatran étexilate supérieures à celles recommandées expose le patient à une augmentation du risque de saignement.

En cas de suspicion de surdosage, des tests de coagulation peuvent permettre de déterminer le risque de saignement (voir rubriques 4.4 et 5.1). De même qu'en cas de mesures additionnelles, comme par exemple l'initiation d'une dialyse, un test quantitatif calibré du TT dilué ou des mesures répétées du TT dilué permettent de prévoir le moment où certains niveaux de concentration du dabigatran seront atteints (voir rubrique 5.1).

Une anticoagulation excessive peut nécessiter l'arrêt du traitement par dabigatran étexilate. Le dabigatran étant principalement excrété par voie rénale, une diurèse suffisante doit être maintenue. Comme la liaison protéique est faible, le dabigatran peut être dialysé, mais les données cliniques permettant de démontrer l'utilité de cette approche sont limitées (voir rubrique 5.2).

#### **Prise en charge des complications hémorragiques**

En cas de complication hémorragique, le traitement par dabigatran étexilate doit être arrêté et l'origine du saignement recherchée. En fonction de la situation clinique, le médecin pourra envisager un traitement symptomatique approprié, tel qu'une hémostase chirurgicale et un remplacement du volume sanguin.

Chez les patients adultes, dans les situations où une réversion rapide de l'effet anticoagulant du dabigatran est requise, l'agent de réversion spécifique (idarucizumab), qui inhibe les effets pharmacodynamiques du dabigatran, est disponible. L'efficacité et la sécurité de l'idarucizumab n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques (voir rubrique 4.4).

L'utilisation de concentrés de facteurs de coagulation (activés ou non activés) ou de facteur VIIa recombinant peut être envisagée. Il existe des données expérimentales en faveur du rôle de ces médicaments pour inverser l'effet anticoagulant du dabigatran, mais les données sur leur utilité en pratique clinique et sur le risque potentiel de rebond thromboembolique sont très limitées. Les tests de la coagulation peuvent devenir peu fiables suite à l'utilisation de ces concentrés de facteurs de coagulation. La prudence est de mise lors de l'interprétation de ces tests. Une attention particulière doit également être portée lors de l'administration de concentrés plaquettaires en cas de thrombopénie existante, ou si des antiagrégants plaquettaires de longue durée d'action ont été administrés. Tous les traitements symptomatiques doivent être administrés selon l'avis du médecin.

Selon les disponibilités locales, une consultation avec un spécialiste de la coagulation doit être envisagée en cas de saignements majeurs.

## **5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES**

### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

Classe pharmacothérapeutique : agents antithrombotiques, inhibiteurs directs de la thrombine,  
Code ATC : B01AE07

#### **Mécanisme d'action**

Le dabigatran éxexilate est une petite molécule sous forme de prodrogue qui n'exerce aucune activité pharmacologique. Après administration orale, le dabigatran éxexilate est rapidement absorbé et converti en dabigatran, par hydrolyse catalysée par une estérase, dans le plasma et dans le foie. Le dabigatran est un inhibiteur direct puissant, compétitif et réversible de la thrombine et est la principale substance active plasmatique.

La thrombine (sérine protéase) permettant la conversion du fibrinogène en fibrine lors de la cascade de la coagulation, son inhibition empêche la formation de caillot. Le dabigatran inhibe la thrombine libre, la thrombine liée à la fibrine et l'agrégation plaquettaire induite par la thrombine.

#### **Effets pharmacodynamiques**

L'efficacité antithrombotique et l'activité anticoagulante du dabigatran après injection intraveineuse et celles du dabigatran éxexilate après administration orale ont été démontrées sur divers modèles animaux de thrombose, dans des études in vivo et ex vivo chez l'animal.

Les études de phase II ont montré une corrélation claire entre la concentration plasmatique du dabigatran et l'intensité de l'effet anticoagulant. Le dabigatran prolonge le temps de thrombine (TT), le temps d'écarine (ECT) et le temps de céphaline activée (TCA).

Le test quantitatif du temps de thrombine (TT) dilué calibré fournit une estimation de la concentration plasmatique de dabigatran, qui peut être comparée à celle attendue. Quand le TT dilué calibré donne un résultat de concentration plasmatique de dabigatran égal ou inférieur à la limite de quantification, la réalisation d'un test de coagulation additionnel, tel que le TT, l'ECT ou le TCA, doit être envisagée.

L'ECT fournit une mesure directe de l'activité des inhibiteurs directs de la thrombine.

Le TCA est un test disponible dans tous les laboratoires d'analyses médicales. Il permet d'obtenir une indication approximative de l'intensité de l'anticoagulation obtenue avec le dabigatran. Cependant, le TCA a une sensibilité limitée et n'est pas adapté pour quantifier avec précision l'effet anticoagulant, en particulier en cas de concentrations plasmatiques élevées de dabigatran. Bien que des valeurs élevées du TCA doivent être interprétées avec prudence, un tel résultat indique que le patient est anticoagulé.

D'une façon générale, on peut considérer que ces mesures de l'activité anticoagulante peuvent refléter les taux de dabigatran et fournissent des recommandations pour l'évaluation du risque de saignement.

En effet, une concentration résiduelle de dabigatran ou un test de coagulation comme le TCA mesuré, à l'état résiduel (pour les seuils du TCA voir la rubrique 4.4, tableau 5), supérieurs au 90e percentile sont considérés comme étant associés à un risque accru de saignement.

Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque (prévention des AVC/ES liés à la FA)

À l'état d'équilibre, la moyenne géométrique de la concentration plasmatique de dabigatran au pic, mesurée environ 2 heures après l'administration de 150 mg de dabigatran éxexilate deux fois

par jour, était de 175 ng/mL, dans une fourchette de 117-275 ng/mL (25e-75e percentile). La moyenne géométrique de la concentration résiduelle de dabigatran, mesurée le matin, à la fin de l'intervalle d'administration (soit 12 heures après la dose du soir de 150 mg de dabigatran), était en moyenne de 91,0 ng/mL, dans une fourchette de 61,0 à 143 ng/mL (25e-75e percentile).

Chez les patients présentant une FANV traités pour la prévention de l'AVC et de l'embolie systémique par le dabigatran éteixilate à la dose de 150 mg deux fois par jour,

- le 90e percentile de la concentration plasmatique du dabigatran, mesurée à l'état résiduel (10-16 heures après la prise de la dernière dose), était d'environ 200 ng/mL,
- un ECT à l'état résiduel (10-16 heures après la prise de la dernière dose), augmenté d'environ 3 fois la limite supérieure de la normale correspond au 90e percentile observé (allongement de l'ECT de 103 secondes),
- un rapport de TCA à l'état résiduel (10-16 heures après la prise de la dernière dose) dépassant 2 fois la limite supérieure de la normale (allongement du TCA d'environ 80 secondes) correspond au 90e percentile observé.

#### Traitement des TVP et des EP, et prévention des récurrences de TVP et d'EP chez l'adulte (TVP/EP)

Chez les patients traités pour TVP et EP par dabigatran éteixilate 150 mg deux fois par jour, la moyenne géométrique de la concentration résiduelle de dabigatran, mesurée 10 à 16 heures après la prise de la dernière dose, à la fin de l'intervalle d'administration (soit 12 heures après la dose du soir de 150 mg de dabigatran), a été de 59,7 ng/mL, dans une fourchette de 38,6 à 94,5 ng/mL (25e au 75e percentile). Pour le traitement de la TVP et de l'EP par le dabigatran éteixilate 150 mg deux fois par jour,

- le 90e percentile de la concentration plasmatique du dabigatran, mesurée à l'état résiduel (10-16 heures après la prise de la dernière dose), était d'environ 146 ng/mL,
- un ECT à l'état résiduel (10 à 16 heures après la prise de la dernière dose) augmenté d'environ 2,3 fois par rapport à la valeur initiale correspond au 90e percentile observé (allongement de l'ECT de 74 secondes),
- le 90e percentile de la mesure du TCA à l'état résiduel (10 à 16 heures après la dose précédente) était de 62 secondes, ce qui correspondait à 1,8 fois la valeur initiale.

Aucune donnée pharmacocinétique n'est disponible chez les patients traités pour la prévention des récurrences de TVP et d'EP par une dose de 150 mg de dabigatran éteixilate deux fois par jour.

#### **Efficacité et sécurité cliniques**

##### Origine ethnique

Aucune différence ethnique cliniquement pertinente entre les patients caucasiens, afro-américains, hispaniques, japonais ou chinois n'a été observée.

##### Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque

La démonstration de l'efficacité clinique du dabigatran éxilate est issue de l'étude RE-LY (Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant therapy), une étude multicentrique, internationale, randomisée en groupes parallèles, évaluant deux doses administrées en aveugle de dabigatran éxilate (110 mg et 150 mg deux fois par jour) par rapport à l'administration en ouvert de warfarine chez des patients présentant une fibrillation atriale et à risque modéré à élevé d'AVC et d'embolie systémique. L'objectif principal de cette étude était de déterminer si le dabigatran éxilate était non inférieur à la warfarine dans la diminution de la survenue du critère d'évaluation composite d'AVC et d'embolie systémique. La supériorité statistique a également été analysée.

Dans l'étude RE-LY, 18 113 patients ont été randomisés au total : ils avaient un âge moyen de 71,5 ans et présentaient un score CHADS2 moyen de 2,1. Cette population de patients comprenait 64 % d'hommes, 70 % de Caucasiens et 16 % d'Asiatiques. Pour les patients randomisés dans le groupe warfarine, le pourcentage moyen du temps de l'étude durant lequel l'INR s'est trouvé dans l'intervalle thérapeutique (INR 2-3) était de 64,4 % (médiane 67 %).

L'étude RE-LY a permis de démontrer que le dabigatran éxilate, à une dose de 110 mg deux fois par jour, est non inférieur à la warfarine dans la prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les sujets souffrant de fibrillation atriale et est associé à un risque réduit d'hémorragie intracrânienne, d'hémorragie de tout type et d'hémorragie majeure. La dose de 150 mg deux fois par jour réduit significativement le risque d'AVC ischémique et hémorragique, de décès d'origine vasculaire, d'hémorragie intracrânienne et d'hémorragie de tout type par rapport à la warfarine. Les taux d'hémorragie majeure à cette dose ont été comparables à ceux observés avec la warfarine. Les taux d'infarctus du myocarde ont été légèrement augmentés avec le dabigatran éxilate 110 mg deux fois par jour et 150 mg deux fois par jour par rapport à la warfarine (hazard ratio de 1,29 ; p = 0,0929 et de 1,27 ; p = 0,1240, respectivement). En améliorant le contrôle de l'INR, le bénéfice observé du dabigatran éxilate par rapport à la warfarine diminue.

Les tableaux 17 à 19 présentent le détail des principaux résultats de l'étude dans la population générale :

**Tableau 17 : Analyse de la survenue du premier événement, AVC ou embolie systémique (critère d'évaluation principal) au cours de la période d'évaluation de l'étude RE-LY.**

|                                           | Dabigatran éxilate<br>110 mg deux fois<br>par jour | Dabigatran<br>éxilate 150 mg<br>deux fois par jour | Warfarine  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Sujets randomisés                         | 6 015                                              | 6 076                                              | 6 022      |
| AVC et/ou embolie<br>systémique           |                                                    |                                                    |            |
| Incidence (%)                             | 183 (1,54)                                         | 135 (1,12)                                         | 203 (1,72) |
| Hazard ratio vs<br>warfarine (IC 95<br>%) | 0,89 (0,73 ; 1,09)                                 | 0,65 (0,52 ; 0,81)                                 |            |
| Valeur p de<br>supériorité                | p = 0,2721                                         | p = 0,0001                                         |            |

Le % indique le taux d'événements annuels

**Tableau 18 : Analyse de la survenue du premier événement, AVC ischémique ou hémorragique au cours de la période d'évaluation de l'étude RE-LY.**

|                   | Dabigatran<br>éxilate 110 mg<br>deux fois par jour | Dabigatran<br>éxilate 150 mg<br>deux fois par jour | Warfarine |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Sujets randomisés | 6 015                                              | 6 076                                              | 6 022     |



|                                           | Dabigatranétexilate<br>110 mgdeux fois<br>par jour | Dabigatranétexilate<br>150 mgdeux fois<br>par jour | Warfarine  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| AVC                                       |                                                    |                                                    |            |
| Incidence (%)                             | 171 (1,44)                                         | 123 (1,02)                                         | 187 (1,59) |
| Hazard ratio vs<br>warfarine (IC 95<br>%) | 0,91 (0,74 ; 1,12)                                 | 0,64 (0,51 ; 0,81)                                 |            |
| Valeur de p                               | 0,3553                                             | 0,0001                                             |            |
| Embolie<br>systémique                     |                                                    |                                                    |            |
| Incidence (%)                             | 15 (0,13)                                          | 13 (0,11)                                          | 21 (0,18)  |
| Hazard ratio vs<br>warfarine (IC 95<br>%) | 0,71 (0,37 ; 1,38)                                 | 0,61 (0,30 ; 1,21)                                 |            |
| Valeur de p                               | 0,3099                                             | 0,1582                                             |            |
| AVC ischémique                            |                                                    |                                                    |            |
| Incidence (%)                             | 152 (1,28)                                         | 104 (0,86)                                         | 134 (1,14) |
| Hazard ratio vs<br>warfarine (IC 95<br>%) | 1,13 (0,89 ; 1,42)                                 | 0,76 (0,59 ; 0,98)                                 |            |
| Valeur de p                               | 0,3138                                             | 0,0351                                             |            |
| AVC hémorragique                          |                                                    |                                                    |            |
| Incidence (%)                             | 14 (0,12)                                          | 12 (0,10)                                          | 45 (0,38)  |
| Hazard ratio vs<br>warfarine (IC 95<br>%) | 0,31 (0,17 ; 0,56)                                 | 0,26 (0,14 ; 0,49)                                 |            |
| Valeur de p                               | 0,0001                                             | < 0,0001                                           |            |

Le % indique le taux d'événements annuels

**Tableau 19 : Analyse de la mortalité toutes causes et de la mortalité d'origine cardiovasculaire au cours de la période d'évaluation de l'étude RE-LY.**

|                                           | Dabigatran<br>étexilate 110 mg<br>deux fois par jour | Dabigatran<br>étexilate 150 mg<br>deux fois par jour | Warfarine  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Sujets randomisés                         | 6 015                                                | 6 076                                                | 6 022      |
| Mortalité toutes<br>causes                |                                                      |                                                      |            |
| Incidence (%)                             | 446 (3,75)                                           | 438 (3,64)                                           | 487 (4,13) |
| Hazard ratio vs<br>warfarine (IC 95<br>%) | 0,91 (0,80 ; 1,03)                                   | 0,88 (0,77 ; 1,00)                                   |            |
| Valeur de p                               | 0,1308                                               | 0,0517                                               |            |
| Mortalité<br>vasculaire                   |                                                      |                                                      |            |
| Incidence (%)                             | 289 (2,43)                                           | 274 (2,28)                                           | 317 (2,69) |

|                                     |                    |                    |  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Hazard ratio vs warfarine (IC 95 %) | 0,90 (0,77 ; 1,06) | 0,85 (0,72 ; 0,99) |  |
| Valeur de p                         | 0,2081             | 0,0430             |  |

Le % indique le taux d'événements annuels

Les tableaux 20 à 21 présentent les résultats du critère principal d'efficacité et de sécurité dans les sous-populations. Pour le critère principal, AVC et embolie systémique, aucun sous-groupe (c'est-à-dire en fonction de l'âge, du poids, du sexe, de la fonction rénale, de l'origine ethnique, etc.) n'a été identifié comme ayant un risque relatif par rapport à la warfarine différent.

**Tableau 20 : Hazard ratio et IC à 95 % pour les AVC/embolie systémique par sous-groupe.**

| Critère       | Dabigatran éxétilate 110 mg deux fois par jour vs warfarine | Dabigatran éxétilate 150 mg deux fois par jour vs warfarine |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Âge (années)  |                                                             |                                                             |
| < 65          | 1,10 (0,64 ; 1,87)                                          | 0,51 (0,26 ; 0,98)                                          |
| 65 ? et < 75  | 0,86 (0,62 ; 1,19)                                          | 0,67 (0,47 ; 0,95)                                          |
| ? 75          | 0,88 (0,66 ; 1,17)                                          | 0,68 (0,50 ; 0,92)                                          |
| ? 80          | 0,68 (0,44 ; 1,05)                                          | 0,67 (0,44 ; 1,02)                                          |
| ClCr (mL/min) |                                                             |                                                             |
| 30 ? et < 50  | 0,89 (0,61 ; 1,31)                                          | 0,48 (0,31 ; 0,76)                                          |
| 50 ? et < 80  | 0,91 (0,68 ; 1,20)                                          | 0,65 (0,47 ; 0,88)                                          |
| ? 80          | 0,81 (0,51 ; 1,28)                                          | 0,69 (0,43 ; 1,12)                                          |

Pour le critère principal de sécurité, les hémorragies majeures, un lien entre l'effet du traitement et l'âge a été observé. Le risque relatif de saignement avec le dabigatran par rapport à la warfarine a augmenté avec l'âge. Le risque relatif était plus élevé chez les patients dont l'âge était ? 75 ans. L'utilisation concomitante d'antiagrégants plaquettaires (AAS ou clopidogrel) a environ doublé les taux d'EHM à la fois avec le dabigatran éxétilate et la warfarine. Aucun lien significatif entre les effets du traitement et les sous-groupes définis par la fonction rénale et le score CHADS2 n'a été observé.

**Tableau 21 : Hazard ratio et IC à 95 % pour les saignements majeurs par sous-groupe.**

| Critère           | Dabigatran éxétilate 110 mg deux fois par jour vs warfarine | Dabigatran éxétilate 150 mg deux fois par jour vs warfarine |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Âge (années)      |                                                             |                                                             |
| < 65              | 0,32 (0,18 ; 0,57)                                          | 0,35 (0,20 ; 0,61)                                          |
| 65 ? et < 75      | 0,71 (0,56 ; 0,89)                                          | 0,82 (0,66 ; 1,03)                                          |
| ? 75              | 1,01 (0,84 ; 1,23)                                          | 1,19 (0,99 ; 1,43)                                          |
| ? 80              | 1,14 (0,86 ; 1,51)                                          | 1,35 (1,03 ; 1,76)                                          |
| ClCr (mL/min)     |                                                             |                                                             |
| 30 ? et < 50      | 1,02 (0,79 ; 1,32)                                          | 0,94 (0,73 ; 1,22)                                          |
| 50 ? et < 80      | 0,75 (0,61 ; 0,92)                                          | 0,90 (0,74 ; 1,09)                                          |
| ? 80              | 0,59 (0,43 ; 0,82)                                          | 0,87 (0,65 ; 1,17)                                          |
| Utilisation d'AAS | 0,84 (0,69 ; 1,03)                                          | 0,97 (0,79 ; 1,18)                                          |

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Utilisation du clopidogrel | 0,89 (0,55 ; 1,45) | 0,92 (0,57 ; 1,48) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|

RELY-ABLE (extension multicentrique à long terme pour les patients ayant une fibrillation atriale traités par dabigatran et ayant participé à l'étude RE-LY)

L'étude d'extension de RE-LY (RELY-ABLE) a fourni des informations de sécurité supplémentaires pour une cohorte de patients ayant poursuivi le traitement par dabigatran éxexilate à la même dose que dans l'étude RE-LY. Les patients étaient éligibles pour l'essai RELY-ABLE s'ils n'avaient pas définitivement arrêté le traitement à l'étude lors de la visite de fin d'étude de RE-LY. Les patients inclus ont reçu la même dose de dabigatran éxexilate que celle attribuée en double aveugle dans l'essai RE-LY, pendant un maximum de 43 mois de suivi après RE-LY (durée moyenne totale de suivi RE- LY + RELY-ABLE : 4,5 ans). 5 897 patients ont été recrutés, ce qui représente 49 % des patients initialement randomisés pour recevoir le dabigatran éxexilate dans RE-LY et 86 % des patients éligibles pour RELY-ABLE.

Au cours des 2,5 années supplémentaires de traitement dans RELY-ABLE, avec une exposition maximale de plus de 6 ans (exposition totale RE-LY + RELY-ABLE), le profil de sécurité à long terme du dabigatran éxexilate a été confirmé pour les deux doses étudiées, 110 mg deux fois par jour et 150 mg deux fois par jour. Aucune nouvelle donnée de sécurité n'a été observée.

Les taux de survenue des événements constituant des critères d'évaluation, y compris hémorragie majeure et autres événements hémorragiques, étaient cohérents avec ceux observés dans RE-LY.

Données issues des études non interventionnelles

Une étude non interventionnelle (GLORIA-AF) a recueilli prospectivement (dans sa seconde phase) des données de sécurité et d'efficacité, en conditions réelles d'utilisation, chez des patients atteints d'une FANV nouvellement diagnostiquée, traités par dabigatran éxexilate. L'étude a inclus 4 859 patients sous dabigatran éxexilate (55 % traités par 150 mg deux fois par jour, 43 % traités par 110 mg deux fois par jour, 2 % traités par 75 mg deux fois par jour). Les patients ont été suivis pendant 2 ans. Les scores CHADS2 et HAS-BLED moyens étaient respectivement de 1,9 et 1,2. La durée moyenne du suivi en cours de traitement était de 18,3 mois. Un saignement majeur est survenu chez 0,97 pour 100 patients-années. Un saignement mettant en jeu le pronostic vital a été rapporté chez 0,46 pour 100 patients-années, une hémorragie intracrânienne chez 0,17 pour 100 patients-années et un saignement gastro-intestinal chez 0,60 pour 100 patients-années. Un accident vasculaire cérébral est survenu chez 0,65 pour 100 patients-années.

Par ailleurs, lors d'une étude non interventionnelle (Graham DJ et al., Circulation. 2015 ; 131 : 157-164) ayant inclus plus de 134 000 patients âgés atteints de FANV aux États-Unis (représentant plus de 37 500 patients-années de suivi sous traitement), le dabigatran éxexilate (84 % des patients traités par 150 mg deux fois par jour et 16 % traités par 75 mg deux fois par jour) a été associé à une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral ischémique (hazard ratio de 0,80 ; intervalle de confiance [IC] à 95 % 0,67-0,96), d'hémorragie intracrânienne (hazard ratio de 0,34 ; IC à 95 % 0,26-0,46) et de mortalité (hazard ratio de 0,86 ; IC à 95 % 0,77-0,96), et à une augmentation du risque de saignement gastro-intestinal (hazard ratio de 1,28 ; IC à 95 % 1,14-1,44) en comparaison avec la warfarine. Aucune différence n'a été observée pour les saignements majeurs (hazard ratio de 0,97 ; IC à 95 % 0,88-1,07).

Ces observations réalisées en conditions réelles concordent avec le profil de sécurité et d'efficacité du dabigatran éxexilate établi lors de l'étude RE-LY pour cette indication.

Patients subissant une ablation par cathéter de la fibrillation atriale

Une étude exploratoire multicentrique, prospective, en ouvert, randomisée, dont le critère principal a été évalué de manière centralisée et en aveugle par un comité indépendant (étude RE-CIRCUIT), a été menée chez 704 patients recevant un traitement anticoagulant stable. Cette étude comparait le traitement sans interruption par dabigatran éxexilate 150 mg deux fois par jour

au traitement sans interruption par warfarine ajustée en fonction de l'INR lors de l'ablation par cathéter de la fibrillation atriale paroxystique ou persistante. Parmi les 704 patients inclus, 317 ont bénéficié d'une ablation de la fibrillation atriale sans interruption du traitement par dabigatran et 318 ont bénéficié d'une ablation de la fibrillation atriale sans interruption du traitement par warfarine. Tous les patients ont passé une échocardiographie transœsophagienne (ETO) avant l'ablation par cathéter. Le critère d'évaluation principal (événements hémorragiques majeurs confirmés, définis selon les critères de l'ISTH) est survenu chez 5 patients (1,6 %) du groupe dabigatran éxétilate et chez 22 patients (6,9 %) du groupe warfarine (différence de risque -5,3 % ; IC à 95 % -8,4, -2,2 ;  $p = 0,0009$ ). Aucun événement de type accident vasculaire cérébral/embolie systémique/AIT (critère composite) n'est survenu dans le bras dabigatran éxétilate et un événement (AIT) est survenu dans le bras warfarine entre l'ablation et 8 semaines suivant l'ablation. Cette étude exploratoire a montré que le dabigatran éxétilate était associé à une réduction significative du taux d'EHM en comparaison avec la warfarine ajustée à l'INR dans le cadre d'une ablation.

Patients ayant bénéficié d'une intervention coronarienne percutanée (ICP) avec pose de stent

Une étude (de phase IIIb) prospective, randomisée, en ouvert, avec analyse en aveugle des critères (PROBE) visant à comparer une bithérapie par dabigatran éxétilate (110 mg ou 150 mg deux fois par jour) plus clopidogrel ou ticagrélor (antagoniste de P2Y<sub>12</sub>) à une trithérapie par warfarine (ajustée à un INR compris entre 2,0 et 3,0) plus clopidogrel ou ticagrélor et AAS a été réalisée chez 2 725 patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire ayant bénéficié d'une ICP avec pose de stent (RE-DUAL PCI). Les patients étaient randomisés pour recevoir une bithérapie avec dabigatran éxétilate 110 mg deux fois par jour, une bithérapie avec dabigatran éxétilate 150 mg deux fois par jour ou une trithérapie avec warfarine. Les patients âgés ne résidant pas aux États-Unis (? 80 ans pour tous les pays, ? 70 ans pour le Japon) étaient randomisés soit dans le groupe bithérapie avec dabigatran éxétilate 110 mg soit dans le groupe trithérapie avec warfarine. Le critère principal était un critère combiné des hémorragies majeures selon la définition de l'ISTH ou d'événement hémorragique non majeur cliniquement pertinent.

L'incidence du critère principal était de 15,4 % (151 patients) dans le groupe bithérapie avec dabigatran éxétilate 110 mg contre 26,9 % (264 patients) dans le groupe trithérapie avec warfarine (hazard ratio de 0,52, IC à 95 % 0,42-0,63 ;  $p < 0,0001$  pour la non-infériorité et  $p < 0,0001$  pour la supériorité) et 20,2 % (154 patients) dans le groupe bithérapie avec dabigatran éxétilate 150 mg contre 25,7 % (196 patients) dans le groupe trithérapie avec warfarine correspondant (hazard ratio de 0,72 ; IC à 95 % 0,58-0,88 ;  $p < 0,0001$  pour la non-infériorité et  $p = 0,002$  pour la supériorité). Il apparaît dans l'analyse descriptive que les événements hémorragiques majeurs selon les critères TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) étaient moins nombreux dans les deux groupes bithérapie avec dabigatran éxétilate que dans le groupe trithérapie avec warfarine : 14 événements (1,4 %) dans le groupe bithérapie avec dabigatran éxétilate 110 mg contre 37 événements (3,8 %) dans le groupe trithérapie avec warfarine (hazard ratio de 0,37 ; IC à 95 % 0,20-0,68 ;  $p = 0,002$ ), et 16 événements (2,1 %) dans le groupe bithérapie avec dabigatran éxétilate 150 mg contre 30 événements (3,9 %) dans le groupe trithérapie avec warfarine correspondant (hazard ratio de 0,51 ; IC à 95 % 0,28-0,93 ;  $p = 0,03$ ).

Les deux groupes bithérapie avec dabigatran éxétilate présentaient des taux plus faibles d'hémorragies intracrâniennes que le groupe trithérapie avec warfarine correspondant : 3 événements (0,3 %) dans le groupe bithérapie avec dabigatran éxétilate 110 mg contre 10 événements (1,0 %) dans le groupe trithérapie avec warfarine (hazard ratio de 0,30 ; IC à 95 % 0,08-1,07 ;  $p = 0,06$ ), et 1 événement (0,1 %) dans le groupe bithérapie avec dabigatran éxétilate 150 mg contre 8 événements (1,0 %) dans le groupe trithérapie avec warfarine correspondant (hazard ratio de 0,12 ; IC à 95 % 0,02-0,98 ;  $p = 0,047$ ). L'incidence du critère d'efficacité composite associant décès, événements thromboemboliques (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou embolie systémique) ou revascularisation non prévue dans les

deux groupes bithérapie avec dabigatran éxétilate combinés était non inférieure à celle du groupe trithérapie avec warfarine (13,7 % contre 13,4 %, respectivement ; hazard ratio de 1,04 ; IC à 95 % 0,84-1,29 ; p = 0,0047 pour la non-infériorité). Il n'y avait pas de différence statistique pour les composantes individuelles des critères d'efficacité entre les deux groupes bithérapie avec dabigatran éxétilate et le groupe trithérapie avec warfarine.

Cette étude a démontré que la bithérapie par dabigatran éxétilate et un antagoniste de P2Y12 réduit significativement le risque d'hémorragie par rapport à la trithérapie avec warfarine, avec une non-infériorité pour le critère composite d'événements thromboemboliques chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire qui ont bénéficié d'une ICP avec pose de stent.

Traitement des TVP et des EP chez l'adulte (traitement de la TVP/EP)

L'efficacité et la sécurité ont été explorées au cours de deux études multicentriques de protocoles identiques, randomisées, en double aveugle, en groupes parallèles RE-COVER et RE-COVER II. Ces études ont comparé le dabigatran éxétilate (150 mg deux fois par jour) à la warfarine (INR cible 2,0 à 3,0) chez des patients présentant une TVP et/ou une EP aiguës. L'objectif principal de ces études était de déterminer la non-infériorité du dabigatran par rapport à la warfarine pour réduire la survenue du critère principal, un critère composite regroupant les récurrences de TVP et/ou EP symptomatiques et les décès apparentés, au cours de la période de traitement de six mois.

Dans les études poolées RE-COVER et RE-COVER II, 5 107 patients ont été traités parmi les 5 153 randomisés.

La durée du traitement avec la dose fixe de dabigatran était de 174,0 jours sans surveillance de la coagulation. Chez les patients recevant la warfarine, le temps médian passé dans l'intervalle thérapeutique (INR 2,0 à 3,0) était de 60,6 %.

Les études ont démontré que le traitement par le dabigatran éxétilate 150 mg deux fois par jour était non inférieur au traitement par la warfarine (marge de non-infériorité pour RE-COVER et RE-COVER II : 3,6 pour la différence de risque et 2,75 pour le hazard ratio).

**Tableau 22 : Analyse des critères principaux et secondaires d'efficacité (les ETEV ont constitué un critère composite de la TVP et/ou de l'EP) jusqu'à la fin de la période post-traitement des études poolées RE-COVER et RE-COVER II**

|                                                                  | Dabigatran éxétilate<br>150 mg deux fois par<br>jour | Warfarine   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Patients traités                                                 | 2 553                                                | 2 554       |
| Récidives d'ETEV<br>symptomatiques et<br>décès liés à des ETEV   | 68 (2,7 %)                                           | 62 (2,4 %)  |
| Hazard ratio vs<br>warfarine (intervalle de<br>confiance à 95 %) | 1,09 (0,77 ; 1,54)                                   |             |
| Critères secondaires<br>d'efficacité                             |                                                      |             |
| Récidives d'ETEV<br>symptomatiques et<br>décès toutes causes     | 109 (4,3 %)                                          | 104 (4,1 %) |
| Intervalle de confiance à<br>95 %                                | 3,52 ; 5,13                                          | 3,34 ; 4,91 |
| TVP symptomatique                                                | 45 (1,8 %)                                           | 39 (1,5 %)  |

|                                   | Dabigatran étexilate<br>150 mg deux fois par<br>jour | Warfarine   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Intervalle de confiance à<br>95 % | 1,29 ; 2,35                                          | 1,09 ; 2,08 |
| EP symptomatique                  | 27 (1,1 %)                                           | 26 (1,0 %)  |
| Intervalle de confiance à<br>95 % | 0,70 ; 1,54                                          | 0,67 ; 1,49 |
| Décès liés à des ETEV             | 4 (0,2 %)                                            | 3 (0,1 %)   |
| Intervalle de confiance à<br>95 % | 0,04 ; 0,40                                          | 0,02 ; 0,34 |
| Mortalité toutes causes           | 51 (2,0 %)                                           | 52 (2,0 %)  |
| Intervalle de confiance à<br>95 % | 1,49 ; 2,62                                          | 1,52 ; 2,66 |

#### Prévention des récurrences des TVP et des EP chez l'adulte (prévention de la TVP/EP)

Deux études randomisées, en double aveugle et en groupes parallèles, ont été réalisées chez des patients précédemment traités par anticoagulant. L'étude contrôlée par la warfarine RE-MEDY a inclus des patients déjà traités pendant 3 à 12 mois et nécessitant un traitement anticoagulant complémentaire, et l'étude contrôlée par placebo RE-SONATE a inclus des patients déjà traités pendant 6 à 18 mois par des AVK.

L'objectif de l'étude RE-MEDY était de comparer la sécurité et l'efficacité du dabigatran étexilate oral (150 mg deux fois par jour) à celles de la warfarine (INR cible : 2,0 à 3,0) pour le traitement à long terme et la prévention des récurrences de TVP et/ou d'EP symptomatiques. Au total, 2 866 patients ont été randomisés et 2 856 patients ont été traités. La durée du traitement par le dabigatran étexilate était comprise entre 6 et 36 mois (médiane : 534,0 jours). Chez les patients recevant la warfarine, le temps médian passé dans l'intervalle thérapeutique (INR : 2,0 à 3,0) était de 64,9 %.

L'étude RE-MEDY a démontré que le traitement par le dabigatran étexilate 150 mg deux fois par jour était non inférieur à la warfarine (marge de non-infériorité : 2,85 pour le hazard ratio et 2,8 pour la différence de risque).

**Tableau 23 : Analyse des critères principaux et secondaires d'efficacité (les ETEV ont constitué un critère composite de la TVP et/ou de l'EP) jusqu'à la fin de la période post-traitement de l'étude RE-MEDY**

|                                                                  | Dabigatran<br>étexilate 150 mg<br>deux fois par jour | Warfarine  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Patients traités                                                 | 1 430                                                | 1 426      |
| Récurrences d'ETEV<br>symptomatiques et décès liés à<br>des ETEV | 26 (1,8 %)                                           | 18 (1,3 %) |
| Hazard ratio vs warfarine<br>(intervalle de confiance à 95 %)    | 1,44 (0,78, 2,64)                                    |            |
| Marge de non-infériorité                                         | 2,85                                                 |            |
| Patients présentant des<br>événements à 18 mois                  | 22                                                   | 17         |
| Risque cumulé à 18 mois (%)                                      | 1,7                                                  | 1,4        |

|                                                              | Dabigatran<br>étexilate 150 mg<br>deux fois par jour | Warfarine   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Différence de risque vs warfarine (%)                        | 0,4                                                  |             |
| Intervalle de confiance à 95 %                               |                                                      |             |
| Marge de non-infériorité                                     | 2,8                                                  |             |
| Critères d'efficacité secondaires                            |                                                      |             |
| Récidives d'ETEV<br>symptomatiques et décès toutes<br>causes | 42 (2,9 %)                                           | 36 (2,5 %)  |
| Intervalle de confiance à 95 %                               | 2,12 ; 3,95                                          | 1,77 ; 3,48 |
| TVP symptomatique                                            | 17 (1,2 %)                                           | 13 (0,9 %)  |
| Intervalle de confiance à 95 %                               | 0,69 ; 1,90                                          | 0,49 ; 1,55 |
| EP symptomatique                                             | 10 (0,7 %)                                           | 5 (0,4 %)   |
| Intervalle de confiance à 95 %                               | 0,34 ; 1,28                                          | 0,11 ; 0,82 |
| Décès liés à des ETEV                                        | 1 (0,1 %)                                            | 1 (0,1 %)   |
| Intervalle de confiance à 95 %                               | 0,00 ; 0,39                                          | 0,00 ; 0,39 |
| Mortalité toutes causes                                      | 17 (1,2 %)                                           | 19 (1,3 %)  |
| Intervalle de confiance à 95 %                               | 0,69 ; 1,90                                          | 0,80 ; 2,07 |

L'objectif de l'étude RE-SONATE était d'évaluer la supériorité du dabigatran étexilate vs placebo dans la prévention des récurrences de TVP et/ou d'EP symptomatiques chez des patients ayant déjà reçu pendant 6 à 18 mois un traitement par AVK. Le traitement programmé était 150 mg de dabigatran étexilate deux fois par jour pendant six mois sans nécessité d'une surveillance.

L'étude RE-SONATE démontre la supériorité du dabigatran étexilate par rapport au placebo dans la prévention des récurrences de TVP/EP symptomatiques incluant les décès inexpliqués, avec une réduction du risque de 5,6 % à 0,4 % (réduction du risque relatif de 92 % d'après le hazard ratio) pendant la période de traitement ( $p < 0,0001$ ). Toutes les analyses secondaires et les analyses de sensibilité du critère principal et de tous les critères secondaires ont montré la supériorité du dabigatran étexilate par rapport au placebo.

L'étude a inclus un suivi observationnel de 12 mois après la fin de la période de traitement. L'effet du médicament étudié s'est prolongé après l'arrêt du traitement, et ce jusqu'à la fin de la phase de suivi, indiquant un maintien de l'effet initial du traitement par dabigatran étexilate. Aucun effet rebond n'a été observé. À la fin du suivi, les fréquences de survenue des ETEV étaient de 6,9 % chez les patients traités par le dabigatran étexilate et de 10,7 % dans le groupe placebo (hazard ratio de 0,61 [IC à 95 % : 0,42 à 0,88] ;  $p = 0,0082$ ).

**Tableau 24 : Analyse des critères principaux et secondaires d'efficacité (les ETEV ont constitué un critère composite de la TVP et/ou de l'EP) jusqu'à la fin de la période post-traitement de l'étude RE-SONATE.**

|                  | Dabigatran étexilate<br>150 mg deux fois par<br>jour | Placebo |
|------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Patients traités | 681                                                  | 662     |

|                                                                | Dabigatran éxilate<br>150 mg deux fois par<br>jour | Placebo     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Récidives d'ETEV<br>symptomatiques et<br>mortalité associée    | 3 (0,4 %)                                          | 37 (5,6 %)  |
| Hazard ratio vs placebo<br>(intervalle de confiance à<br>95 %) | 0,08 (0,02 ; 0,25)                                 |             |
| Valeur de p pour la<br>supériorité                             | < 0,0001                                           |             |
| Critères secondaires<br>d'efficacité                           |                                                    |             |
| Récidives d'ETEV<br>symptomatiques et décès<br>toutes causes   | 3 (0,4 %)                                          | 37 (5,6 %)  |
| Intervalle de confiance à<br>95 %                              | 0,09 ; 1,28                                        | 3,97 ; 7,62 |
| TVP symptomatique                                              | 2 (0,3 %)                                          | 23 (3,5 %)  |
| Intervalle de confiance à<br>95 %                              | 0,04 ; 1,06                                        | 2,21 ; 5,17 |
| EP symptomatique                                               | 1 (0,1 %)                                          | 14 (2,1 %)  |
| Intervalle de confiance à<br>95 %                              | 0,00 ; 0,82                                        | 1,16 ; 3,52 |
| Décès liés à des ETEV                                          | 0 (0)                                              | 0 (0)       |
| Intervalle de confiance à<br>95 %                              | 0,00 ; 0,54                                        | 0,00 ; 0,56 |
| Décès inexpliqués                                              | 0 (0)                                              | 2 (0,3 %)   |
| Intervalle de confiance à<br>95 %                              | 0,00 ; 0,54                                        | 0,04 ; 1,09 |
| Mortalité toutes causes                                        | 0 (0)                                              | 2 (0,3 %)   |
| Intervalle de confiance à<br>95 %                              | 0,00 ; 0,54                                        | 0,04 ; 1,09 |

#### Essais cliniques dans la prévention des événements thromboemboliques chez des patients porteurs de prothèses valvulaires cardiaques

Un essai de phase II a étudié le dabigatran éxilate et la warfarine chez un total de 252 patients ayant récemment bénéficié d'une chirurgie pour prothèse valvulaire cardiaque mécanique (c'est-à-dire pendant leur hospitalisation) et chez des patients ayant bénéficié d'une chirurgie pour prothèse valvulaire cardiaque mécanique datant de plus de 3 mois. Un nombre plus important d'événements thromboemboliques (principalement des AVC et des thromboses symptomatiques ou asymptomatiques de prothèse valvulaire) et d'événements hémorragiques ont été observés avec le dabigatran éxilate par rapport à la warfarine. Chez les patients en période post-opératoire récente, les saignements majeurs se sont essentiellement manifestés sous forme d'un épanchement péricardique hémorragique, notamment chez ceux ayant débuté le dabigatran éxilate tôt (c'est-à-dire au 3e jour) après la chirurgie pour prothèse valvulaire cardiaque (voir



rubrique 4.3).

## **Population pédiatrique**

### **Prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque**

L'Agence européenne des médicaments a accordé une dérogation à l'obligation de soumettre les résultats d'études réalisées avec le dabigatran éxilate dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique dans l'indication de prévention de l'AVC et de l'embolie systémique chez les patients présentant une FANV (voir rubrique 4.2 pour les informations concernant l'usage pédiatrique).

### **Traitement des ETEV et prévention des récurrences d'ETEV chez les patients pédiatriques**

L'objectif de l'étude DIVERSITY était de démontrer l'efficacité et la sécurité du dabigatran éxilate, en comparaison au traitement de référence, dans le traitement des ETEV chez des patients pédiatriques âgés de moins de 18 ans. Il s'agissait d'une étude de non-infériorité randomisée, en ouvert, en groupes parallèles. Les patients inclus ont été randomisés selon un rapport de 2:1 pour recevoir soit une formulation adaptée à leur âge (gélules, granulés enrobés ou solution buvable) de dabigatran éxilate (dose ajustée en fonction de l'âge et du poids), soit le traitement de référence, à savoir des héparines de bas poids moléculaire (HBPM), des antagonistes de la vitamine K (AVK) ou du fondaparinux (1 patient âgé de 12 ans). Le critère d'évaluation principal était un critère composite comprenant la résolution complète de la thrombose, l'absence de récurrence de l'ETEV et l'absence de décès lié à un ETEV. Les critères d'exclusion incluaient la présence d'une méningite active, d'une encéphalite ou d'un abcès intracrânien.

Au total, 267 patients ont été randomisés. Parmi eux, 176 patients ont reçu le dabigatran éxilate et 90 patients le traitement de référence (1 des patients randomisés n'a pas été traité). Cent soixante-huit patients étaient âgés de 12 à moins de 18 ans, 64 patients étaient âgés de 2 à moins de 12 ans et 35 patients avaient moins de 2 ans.

Parmi les 267 patients randomisés, 81 (45,8 %) du groupe dabigatran éxilate et 38 (42,2 %) du groupe traitement de référence ont satisfait le critère d'évaluation principal composite (résolution complète de la thrombose, absence de récurrence de l'ETEV et absence de décès lié à un ETEV). La différence de taux correspondante a démontré la non-infériorité du dabigatran éxilate par rapport au traitement de référence. Par ailleurs, les résultats ont généralement été cohérents entre les sous- groupes : aucune différence significative n'a été observée en matière d'effet thérapeutique dans les sous-groupes d'âge, de sexe, de région et de présence de certains facteurs de risque.

Pour les 3 strates d'âge, les proportions de patients ayant satisfait le critère d'efficacité principal dans les groupes dabigatran éxilate et traitement de référence étaient respectivement de 13/22 (59,1 %) et 7/13 (53,8 %) chez les patients âgés de < 2 ans, de 21/43 (48,8 %) et 12/21 (57,1 %) chez les patients âgés de 2 à < 12 ans, et de 47/112 (42,0 %) et 19/56 (33,9 %) chez les patients âgés de 12 à < 18 ans.

Des événements hémorragiques majeurs confirmés ont été signalés chez 4 patients (2,3 %) du groupe dabigatran éxilate et chez 2 patients (2,2 %) du groupe traitement de référence. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée en matière de délai de survenue du premier événement hémorragique majeur. Trente-huit patients (21,6 %) du groupe dabigatran éxilate et 22 patients (24,4 %) du groupe traitement de référence ont présenté un événement hémorragique confirmé, le plus souvent jugé mineur. Le critère composite d'événement hémorragique majeur (EHM) confirmé ou de saignement non majeur cliniquement pertinent (au cours du traitement) a été rapporté chez 6 patients (3,4 %) du groupe dabigatran éxilate et

chez 3 patients (3,3 %) du groupe traitement de référence.

Une étude de cohortes prospective de sécurité de phase III multicentrique, en ouvert, à un seul groupe (étude 1160.108) a été menée pour évaluer la sécurité du dabigatran éxilate dans la prévention des récives d'ETEV chez des patients pédiatriques âgés de moins de 18 ans. Les patients dont l'état nécessitait un traitement anticoagulant supplémentaire en raison de la présence d'un facteur de risque clinique après la fin du premier traitement de l'ETEV confirmé (de 3 mois minimum) ou après la fin de l'étude DIVERSITY pouvaient être inclus dans l'étude. Les patients éligibles ont reçu une formulation de dabigatran éxilate adaptée à leur âge (gélules, granulés enrobés ou solution buvable) à des doses ajustées en fonction de leur âge et de leur poids jusqu'à la disparition du facteur de risque clinique ou pendant 12 mois maximum. Les critères principaux de l'étude étaient la récive de l'ETEV, les événements hémorragiques majeurs et mineurs, et la mortalité (générale et liée à des événements thrombotiques ou thromboemboliques) à 6 et 12 mois. Les événements constituant des critères d'évaluation étaient confirmés en aveugle par un comité de validation indépendant.

Au total, 214 patients ont été inclus dans l'étude. Parmi eux, 162 appartenaient à la strate d'âge 1 (de 12 à moins de 18 ans), 43 à la strate d'âge 2 (de 2 à moins de 12 ans) et 9 à la strate d'âge 3 (moins de 2 ans). Pendant la période de traitement, 3 patients (1,4 %) ont présenté une récive d'ETEV confirmée par le comité de validation dans les 12 mois suivant le début du traitement. Des événements hémorragiques confirmés par le comité de validation ont été observés chez 48 patients (22,5 %) au cours des 12 premiers mois de la période de traitement. La majorité des événements hémorragiques étaient mineurs. Trois patients (1,4 %) ont présenté un événement hémorragique majeur confirmé par le comité de validation au cours des 12 premiers mois de traitement. Trois patients (1,4 %) ont présenté un saignement non majeur cliniquement pertinent confirmé par le comité de validation au cours des 12 premiers mois de traitement. Aucun décès n'est survenu pendant la période de traitement. Pendant les 12 premiers mois de la période de traitement, 3 patients (1,4 %) ont développé un syndrome post-thrombotique (SPT) ou ont présenté une aggravation de SPT.

## **5.2. Propriétés pharmacocinétiques**

Après administration orale, le dabigatran éxilate est converti rapidement et complètement en dabigatran, qui est la forme active dans le plasma. Le clivage de la prodrogue, dabigatran éxilate, en son principe actif, dabigatran, par hydrolyse catalysée par une estérase, constitue la principale réaction métabolique. La biodisponibilité absolue du dabigatran est d'environ 6,5 % après administration orale de dabigatran éxilate. Après administration orale de dabigatran éxilate chez des volontaires sains, le profil pharmacocinétique plasmatique du dabigatran se caractérise par une augmentation rapide de la concentration plasmatique, avec une C<sub>max</sub> atteinte 0,5 à 2,0 heures après la prise.

### **Absorption**

Une étude évaluant l'absorption post-opératoire du dabigatran éxilate 1 à 3 heures après l'intervention chirurgicale a montré une absorption relativement lente par rapport à celle observée chez des volontaires sains, avec un profil plus régulier des concentrations plasmatiques en fonction du temps, sans pic élevé de concentrations plasmatiques. En période post-opératoire, les concentrations plasmatiques au pic sont atteintes en 6 heures après la prise, sous l'effet de divers facteurs contributifs tels que l'anesthésie, la parésie gastro-intestinale et des effets chirurgicaux indépendants de la formulation orale du médicament. Une autre étude a démontré que l'absorption n'était habituellement lente et retardée que le jour de l'intervention chirurgicale. Les jours suivants, l'absorption du dabigatran a été rapide avec un pic de concentration plasmatique atteint en 2 heures après la prise.

La présence d'aliments n'affecte pas la biodisponibilité du dabigatran étexilate mais retarde de 2 heures le temps nécessaire pour atteindre les concentrations plasmatiques au pic. La  $C_{\max}$  et l'aire sous la courbe (ASC) de la concentration plasmatique ont été proportionnelles à la dose.

La biodisponibilité orale peut être augmentée de 75 % après une dose unique et de 37 % à l'état d'équilibre lorsque l'on ouvre l'enveloppe en hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) de la gélule pour administrer le dabigatran étexilate sous forme de granules au lieu de la gélule entière.

Ainsi, les gélules HPMC doivent toujours être intactes lors de l'administration au patient afin d'éviter une biodisponibilité involontairement accrue du dabigatran étexilate (voir rubrique 4.2).

## **Distribution**

La liaison du dabigatran aux protéines plasmatiques humaines est faible (34-35 %) et indépendante de la concentration. Avec 60 à 70 litres, le volume de distribution du dabigatran excède le volume total de l'eau corporelle, indiquant une distribution tissulaire modérée de dabigatran.

## **Biotransformation**

Le métabolisme et l'excrétion du dabigatran ont été étudiés après une dose intraveineuse unique de dabigatran radiomarké chez des sujets sains de sexe masculin. Après une dose intraveineuse, la radioactivité provenant du dabigatran a été principalement éliminée par voie urinaire (85 %). L'excrétion fécale a représenté 6 % de la dose administrée. La récupération de la radioactivité totale au cours des 168 heures suivant l'injection a été de 88 à 94 %.

Le dabigatran est sujet à une conjugaison formant des acylglucuronides pharmacologiquement actifs. Il existe quatre isomères de position (1-O, 2-O, 3-O, 4-O-acylglucuronide), chacun représentant moins de 10 % de la quantité totale de dabigatran dans le plasma. Des traces d'autres métabolites ont été uniquement détectables avec des méthodes analytiques hautement sensibles. Le dabigatran est principalement éliminé par voie urinaire sous forme inchangée, à un taux d'environ 100 mL/min correspondant au débit de filtration glomérulaire.

## **Élimination**

Les concentrations plasmatiques du dabigatran ont diminué de façon biexponentielle, avec une demi-vie terminale moyenne de 11 heures chez des sujets âgés sains. Après administration de doses multiples, une demi-vie terminale d'environ 12 à 14 heures a été observée. La demi-vie est indépendante de la dose. Comme le montre le tableau 25, la demi-vie est prolongée en cas de trouble de la fonction rénale.

## **Populations particulières**

### **Insuffisance rénale**

Dans des études de phase I, l'exposition (ASC) au dabigatran après administration orale de dabigatran étexilate est environ 2,7 fois plus élevée chez des volontaires adultes présentant une insuffisance rénale modérée (ClCr comprise entre 30 et 50 mL/min) que chez ceux ayant une fonction rénale normale.

Chez un petit nombre de volontaires adultes présentant une insuffisance rénale sévère (ClCr 10-30 mL/min), l'exposition (ASC) au dabigatran a été environ 6 fois plus élevée et la demi-vie environ 2 fois plus longue que dans une population de sujets sans insuffisance rénale (voir rubriques 4.2, 4.3 et 4.4).

**Tableau 25 : Demi-vie du dabigatran total chez les sujets sains et les sujets ayant une fonction rénale altérée.**

| Débit de filtration glomérulaire (ClCr) [mL/min] | Moyenne géométrique (coefficient de variation [CV] géométrique en %; intervalle) de la demi-vie [h] |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ? 80                                             | 13,4 (25,7 % ; 11,0-21,6)                                                                           |
| ? 50-< 80                                        | 15,3 (42,7 % ; 11,7-34,1)                                                                           |
| ? 30-< 50                                        | 18,4 (18,5 % ; 13,3-23,0)                                                                           |
| < 30                                             | 27,2 (15,3 % ; 21,6-35,0)                                                                           |

En outre, l'exposition au dabigatran (à l'état résiduel et au pic de concentration) a été évaluée au cours d'une étude pharmacocinétique prospective, ouverte, randomisée, chez des patients atteints de FANV présentant une insuffisance rénale sévère (définie par une clairance de la créatinine [ClCr] de 15-30 mL/min) et recevant 75 mg de dabigatran éxilate deux fois par jour. Ce schéma posologique a entraîné une moyenne géométrique de la concentration résiduelle de 155 ng/mL (CV géométrique de 76,9 %), mesurée immédiatement avant l'administration de la dose suivante, et une moyenne géométrique de la concentration au pic de 202 ng/mL (CV géométrique de 70,6 %), mesurée deux heures après l'administration de la dernière dose.

L'élimination du dabigatran par hémodialyse a été évaluée chez 7 patients adultes atteints d'insuffisance rénale terminale sans fibrillation atriale. La dialyse a été réalisée avec un débit de dialysat de 700 mL/min, pendant une durée de 4 heures, et un débit sanguin soit de 200 mL/min, soit de 350-390 mL/min. Elle a permis l'élimination de 50 % à 60 % des concentrations de dabigatran, respectivement. La quantité de substance éliminée par dialyse est proportionnelle au débit sanguin jusqu'à un débit sanguin de 300 mL/min. L'activité anticoagulante du dabigatran a diminué avec la diminution des concentrations plasmatiques, et le rapport PK/PD n'a pas été affecté par la procédure.

La clairance de la créatinine médiane dans l'étude RE-LY était de 68,4 mL/min. Près de la moitié (45,8 %) des patients de l'étude RE-LY avaient une ClCr > 50-< 80 mL/min. Les patients ayant une insuffisance rénale modérée (ClCr comprise entre 30 et 50 mL/min) avaient en moyenne des concentrations plasmatiques de dabigatran pré- et post-dose 2,29 et 1,81 fois supérieures, respectivement, par rapport aux patients n'ayant pas d'insuffisance rénale (ClCr ? 80 mL/min).

La ClCr médiane dans l'étude RE-COVER était de 100,3 mL/min. 21,7 % des patients avaient une insuffisance rénale légère (ClCr > 50-< 80 mL/min) et 4,5 % des patients avaient une insuffisance rénale modérée (ClCr comprise entre 30 et 50 mL/min). Les concentrations plasmatiques de dabigatran à l'état d'équilibre avant la dose suivante étaient respectivement 1,7 fois et 3,4 fois supérieures chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée par rapport aux patients ayant une ClCr > 80 mL/min. Des valeurs de ClCr similaires ont été observées au cours de l'étude RE-COVER II.

Les ClCr médianes dans les études RE-MEDY et RE-SONATE étaient respectivement de 99,0 mL/min et 99,7 mL/min. Respectivement 22,9 % et 22,5 % des patients avaient une ClCr > 50-< 80 mL/min, et 4,1 % et 4,8 % avaient une ClCr comprise entre 30 et 50 mL/min dans les études RE-MEDY et RE-SONATE.

### Patients âgés

Des études pharmacocinétiques de phase I spécifiques chez des sujets âgés ont montré une augmentation de 40 à 60 % de l'ASC et de plus de 25 % de la C<sub>max</sub> comparativement à des sujets jeunes. L'effet de l'âge sur l'exposition au dabigatran a été confirmé dans l'étude RE-LY mettant en évidence une concentration résiduelle supérieure d'environ 31 % chez les sujets ? 75 ans et une concentration résiduelle inférieure de 22 % environ chez les sujets < 65 ans par rapport aux sujets de 65 à 75 ans (voir rubriques 4.2 et 4.4).

### Insuffisance hépatique

Aucune modification de l'exposition au dabigatran n'a été observée chez 12 sujets adultes présentant une insuffisance hépatique modérée (Child Pugh B) comparativement à 12 témoins (voir rubriques 4.2 et 4.4).

### Poids corporel

Les concentrations résiduelles de dabigatran étaient d'environ 20 % inférieures chez les patients adultes pesant plus de 100 kg par rapport à ceux pesant entre 50 et 100 kg. La majorité (80,8 %) des sujets pesaient  $\geq$  50 kg et  $<$  100 kg et aucune différence évidente n'a été détectée chez ceux  $\leq$  50 kg (voir rubriques 4.2 et 4.4). Les données cliniques sont limitées chez les patients adultes pesant  $<$  50 kg.

### Sexe

Chez les patientes présentant une fibrillation atriale, les concentrations résiduelles et post-dose étaient en moyenne supérieures de 30 %. Aucun ajustement de dose n'est nécessaire (voir rubrique 4.2).

### Origine ethnique

D'après les données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du dabigatran, aucune différence inter-ethnique cliniquement pertinente n'a été observée entre les patients caucasiens, afro-américains, hispaniques, japonais ou chinois.

### **Population pédiatrique**

L'administration orale de dabigatran étexilate conformément à l'algorithme d'administration défini dans le protocole a entraîné des valeurs d'exposition conformes à celles observées chez les adultes atteints de TVP/EP. D'après l'analyse groupée des données pharmacocinétiques issues des études DIVERSITY et 1160.108, les expositions résiduelles (moyenne géométrique) observées chez les patients pédiatriques atteints d'ETEVE étaient de 53,9 ng/mL, 63,0 ng/mL et 99,1 ng/mL, respectivement, dans les strates d'âge de 0 à  $<$  2 ans, de 2 à  $<$  12 ans et de 12 à  $<$  18 ans.

### **Interactions pharmacocinétiques**

Des études d'interactions in vitro n'ont révélé aucune inhibition ou induction des principales isoenzymes du cytochrome P450. Ces résultats ont été confirmés par des études in vivo chez des volontaires sains, qui n'ont montré aucune interaction entre le dabigatran et l'atorvastatine (CYP3A4), la digoxine (interaction liée au transporteur P-gp) et le diclofénac (CYP2C9).

### **5.3. Données de sécurité préclinique**

Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée et génotoxicité n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme.

Les effets observés lors des études de toxicologie en administration répétée ont été attribués à une exagération de l'effet pharmacodynamique du dabigatran.

Un effet sur la fertilité se traduisant par une diminution des implantations et une augmentation des pertes pré-implantatoires a été observé chez les femelles exposées à 70 mg/kg (5 fois le niveau d'exposition plasmatique chez les patients). À des doses toxiques pour les mères (5 à 10

fois le niveau d'exposition plasmatique chez les patients), une diminution du poids corporel des fœtus et une réduction de la viabilité fœtale ainsi qu'un accroissement des modifications fœtales ont été observés chez le rat et le lapin. Dans une étude pré- et post-natale, une augmentation de la mortalité fœtale a été observée à des doses toxiques pour les mères (dose correspondant à un niveau d'exposition plasmatique 4 fois plus élevé que celui observé chez les patients).

Dans une étude de toxicité juvénile menée sur des rats Han Wistar, la mortalité a été associée à des événements hémorragiques à des expositions comparables à celles ayant entraîné des hémorragies chez les animaux adultes. Chez les rats adultes et juvéniles, la mortalité est jugée liée à l'activité pharmacologique excessive du dabigatran en association aux forces mécaniques exercées lors de l'administration et de la manipulation. Les données de cette étude de toxicité juvénile n'ont pas mis en évidence d'augmentation de la sensibilité à la toxicité ni de toxicité spécifique aux animaux juvéniles.

Des études toxicologiques réalisées pendant la durée de vie de rats et de souris n'ont pas mis en évidence de potentiel tumorigène du dabigatran à des doses maximales allant jusqu'à 200 mg/kg.

Le dabigatran, la fraction active du dabigatran étexilate mésilate, est persistant dans l'environnement.

## **6. DONNEES PHARMACEUTIQUES**

### **6.1. Liste des excipients**

#### Contenu de la gélule

Acide tartrique (E334), hydroxypropylcellulose (E463), talc (E553b), hypromellose (E464)

#### Enveloppe de la gélule

Bleu brillant FCF (E133), dioxyde de titane (E171), hypromellose (E464)

#### Encre d'impression

Gomme laque (E904), propylèneglycol (E1520), solution concentrée d'ammoniaque (E527), oxyde de fer noir (E172), hydroxyde de potassium (E525)

### **6.2. Incompatibilités**

Sans objet.

### **6.3. Durée de conservation**

2 ans.

### **6.4. Précautions particulières de conservation**

A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

### **6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Plaquettes (Aluminium-OPA/Aluminium/PVC) contenant 30, 60 ou 180 gélules.

Plaquettes unitaires prédécoupées (Aluminium/OPA/Aluminium/PVC) contenant 10 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 100 x 1 ou 180 x 1 gélules.

Flacons en polyéthylène haute densité (PEHD) blancs avec bouchon à vis de sécurité enfant en polypropylène (PP) blanc opaque avec doublure de scellage par induction en aluminium et un dessiccant (gel de silice), contenant 100 ou 180 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

## **6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation**

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

### **VIATRIS SANTE**

1 RUE DE TURIN

69007 LYON

## **8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

- 34009 302 872 8 6 : 60 gélules sous plaquettes (Aluminium-OPA/Aluminium/PVC).
- 34009 302 872 9 3 : 60 x 1 gélules sous plaquettes unitaires prédécoupées (Aluminium-OPA/ Aluminium/PVC).

## **9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

## **10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

## **11. DOSIMETRIE**

Sans objet.

## **12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES**

Sans objet.

# **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE**

Liste I